ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ТРУДЫ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГЛАВНОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
им. А. И. ВОЕЙКОВА

Выпуск

376

КЛИМАТОГРАФИЯ

Под редакцией
д-ра геогр. наук А. Н. ЛЕБЕДЕВА

Ленинградский
Гидрометеорологический ин-т
ФИЗЛИОТЕНА
М-х 125186 Малоохтинский пр., 92

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ ЛЕНИНГРАД 1976

В сборнике содержатся статьи по методике обработки и обобщения параметров климата (осадков, снежного покрова, температуры воздуха, скорости ветра, облачности) по территории СССР и зарубежных стран. Значительный интерес представляют статьи по снежному покрову, в которых впервые дается исследование этого элемента в широком плане. Заслуживает внимания статья по методике обобщения ежечасных наблюдений за температурой воздуха. Предложенная методика может явиться одним из возможных приемов уплотнения метеорологической информации для целей климатологии.

Сборник рассчитан на специалистов климатологов, метеорологов, агроклиматологов и инженерно-технических работников, интересующихся климатическими данными различных районов мира и методикой обобщения метеорологических наблюдений.

The publication contains scientific papers on the procedures for processing and generalizing climate parameters (precipitation, snow cover, air temperature, wind velocity, cloud amount) over the territory of the USSR and for foreign countries. Of a considerable interest are the papers on snow cover which present for the first time an extensive study of this element. The paper on the procedure for generalizing the hourly observations of air temperature is worthy of notice. The suggested procedure could be one of possible ways to condense meteorological information for the purposes of climatology.

The publication is intended for specialistst is climatology, meteorology, agroclimatology and engineers interested in climatic data of different parts of the world and in the procedure for generalizing meteorological observations.

И. Д. КОПАНЕВ

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

Распределение снежного покрова в том или ином районе определяется многими факторами, количественный учет которых выолнить далеко не всегда представляется возможным [8].

В гидрометеорологической науке в последнее время при решении многих научных и практических задач широкое применение аряду с физическими получили и статистические методы [1—7, —12].

Опыт показывает, что наиболее эффективным является совместое использование статистических и физических приемов анализа мпирических данных, поскольку они уточняют и дополняют друг руга. Если физические приемы позволяют выявить качественную горону особенностей распределения, то статистические методы озволяют получить количественную оценку.

Изучению распределения снежного покрова на территории наей страны посвящена обширная литература, в которой рассмативаются главным образом средние и экстремальные характеристики. Следует отметить, что в последние годы, после издания Справочника по климату СССР», резко сократилось (до 5%) число абот по снежному покрову равнинных районов страны.

Для удовлетворения запросов многих отраслей народного хозяйства требуются данные не только средней высоты снежного окрова, а и ее вероятности, или обеспеченности, на соответствующей площади. Гидрометеорологическое обеспечение, как известно, осуществляется управлениями Гидрометслужбы по областям, раям, республикам и экономическим районам.

Данные по распределению снежного покрова на территории наей страны помещены в 35 томах «Справочника по климату СССР», причем относятся они к отдельным пунктам. Использование акой обширной и разрозненной информации по снежному покрову в практических и научных целях является затруднительным.

Существуют различные приемы обобщения исходной информации с применением методов математической статистики как в гелиологии [1, 11], так и в климатологии [3—7, 9, 10, 12]. Например методы расчета обеспеченностей получили широкое распространение в климатологических исследованиях и в особенности в работах по климатографии земного шара. В настоящее время выполнены расчеты обеспеченности многих климатических характеристик [4—7, 9, 10, 12, 13]. Что касается снежного покрова, то, на наш взгляд, его вероятностные характеристики изучены недостаточно.

В настоящей статье дается анализ распределения высоты снежного покрова с применением методов математической статистики на территории Северо-Западного УГМС. Для этой цели использованы данные снегомерных съемок за период 1935—1964 гг. в 142 станциях [13]; из них на 93 станциях — снегомерки в полях на 49 станциях — в лесу и на лесных полянах.

Северо-Западное УГМС включает Карельскую АССР, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области; общая площадь составляет около 400 тыс. км². На большей части территории преобладают низменности с абсолютными отметками, не превышающими 100 м [13]. Наряду с низменностями встречаются и возвышенности: в Карелии (средние высоты 180—250 м), Псковской области (Лужское взгорье, Судомская и Бежаницкая возвышенности), в восточных частях Ленинградской и Новгородской областей (Тихвинская гряда, западные отроги Валдайской возвышенности).

Важной особенностью всей рассматриваемой территории является большое количество водных бассейнов (озер и рек) и залесенность: более 50% в Карелии, Ленинградской и Новгородской областях, около 30% — в Псковской области.

Почти вся территория относится к зоне избыточного увлажнения с наличием больших массивов болот. Осадки холодного периода (ноябрь—март), связанные в основном с циклонической деятельностью, плавно убывают в пределах территории с юго-запада на северо-восток, от 200 до 150 мм. Общий характер распределения осадков в отдельных случаях нарушается воздействием холмистого рельефа на циркуляционные процессы.

Число дней со снежным покровом изменяется от 180 (Северная Карелия) до 120 дней (юго-западная часть Псковской области).

Высота снежного покрова в Карелии изменяется с запада на восток, от 40 до 60 см, а на остальной части территории (с ростом залесенности) — с юго-запада на северо-восток, от 30 до 40 см.

Применение метода изолиний, как известно, не исключает возможности проведения их по полю точек, не отражающих действительных изменений высоты снежного покрова, а колебания высоты могут быть вызваны либо ошибками измерений или расчетов, либо случайным выбором данных, а чаще всего — совместными причинами. Поэтому возникает необходимость привлечения методов математической статистики, позволяющих выявить пространственную структуру поля снежного покрова.

В последнее время уделяется большое внимание исследованию пространственно-временных изменений характеристик климата, торые опираются на теорию однородных и изотропных полей.

В отношении снежного покрова также допускается, что его для соответственно на полевых и лесных участках являются однородными. Как известно, под однородным районом понимается кой район, в пределах которого характеристики распределения для метеозлемента принадлежат к одной и той же общей совопности, с учетом климатических особенностей и подстилающей

Таблица 1

Повторяемость (%) высоты снежного покрова на территории Северо-Западного УГМС по месяцам (1 — поле, 2 — лес)

интервал, см	XI		XII		I		II		III		IV	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1—5	64	46	9								72	49
6—10	34	36	32	27	4						2	
11—20	2	18	52	32	38	18	21	2	17		15	15
21—30			7	32	38	29	23	12	24	4	10	8
31—50				9	20	47	50	43	51	43	1	28
51—75						6	5	43	7	53		

оверхности. Критерии однородности районов разработаны в основном только для независимых величин, не имеющих корреляционных связей [11].

Данные табл. 1 отражают особенности формирования снежного покрова на полевых и лесных участках в течение зимы и в известной мере содержат прогностические рекомендации, необходимые при планировании ряда хозяйственных мероприятий. Например, дним из важных агротехнических мероприятий, направленных на увеличение влагозапасов в почве за счет зимних осадков, является снегозадержание. Работы по снегозадержанию ежегодно проводятся в нашей стране на площади 50—60 млн. га в засушливых районах ЕТС, Казахстана и Западной Сибири. Стоимость этих работ обходится почти в 100 млн. руб. [14]. Однако эффективность снегозадержания в связи с регулированием влагозапасов почве нуждается в обстоятельном изучении и прежде всего в определении оптимальных сроков проведения снегозадержания с учетом особенностей формирования и распределения снежного покрова в пределах соответствующей территории.

Обычно за основную характеристику высоты принимают средние декадные высоты снежного покрова. Для решения многих практических задач наибольший интерес представляет максимальная высота, под которой понимается среднее из наибольших декадных высот за зиму. При этом для получения ее определяются

максимальные декадные высоты, выбранные из каждой зимы, независимо от того, в какую декаду месяца они отмечались. Данные распределения средней максимальной высоты снежного покрова на полевых и лесных участках для территории Северо-Западно УГМС помещены соответственно в табл. 2 и 3.

Т а б л и ц а

Средняя максимальная высота снежного покрова на полевых участках

Станция	Высота, см	P %	Станция	Высота, см	P %
Данилово	64	0,8	Крестцы	39	55,4
Пудож	62	2,8	Волхов	38	57,3
Кугановолок	61	5,1	Николаевское	38	59,2
Тосно	58	6,2	Будогощь	37	60,7
Лоухи	56	7,1	Любань	36	61,8
Вяргсиля	56	10,2	Петрозаводск	35	63,0
Лужайка	55	11,5	Сумский Посад	34	65,0
Калевала	54	12,6	Новгород	34	66,0
Подужемье	52	14,7	Идрица	33	68,2
Свирица	51	17,8	Тосно	32	70,3
Охоны	50	20,1	Пушкин	31	71,4
Шугозеро	49	24,3	Холм	31	73,5
Сортавала	48	27,6	Боровичи	30	74,6
Олонец	47	29,6	Кингисепп	30	77,8
Жужмуй	45	35,1	Дно	29	81,0
Девкино	44	39,3	Марково	26	84,1
Красная Гора	44	40,4	Гдов	26	85,3
Белогорка	43	42,5	Псков	26	87,4
Окуловка	43	44,7	Опочка	26	88,5
Токсово	41	46,8	Новосаратовка	25	89,6
Вайдай	41	47,9	Старая Русса	25	91,7
Колежма	40	50,0	Сушево	24	94,8
Вознесенье	39	52,1	Порхов	23	98,2
Тихвин	39	54,3	Пушкинские Горы	23	99,2

Для удобства при анализе данные в табл. 2 и 3 размещают в убывающем порядке, от наибольшего к наименьшему значению высоты снежного покрова. Таблицы дают наглядное представление о вкладе различных высот в формировании снежного покрова на полевых и лесных массивах. Для каждой станции вычислена обеспеченность ($P \%$). Амплитуда, или размах варьирования высоты

ежного покрова, составляет 41 см в поле и 56 см в лесу. На по-
 вых участках наибольшая высота снежного покрова (64 см) от-
 ечается на ст. Данилово (Карелия), а наименьшая (23 см) —
 Порхове (Псковская область). Осадки, выпадающие за холод-
 ый период (ноябрь—март), составляют на указанных станциях

Таблица 3

Средняя максимальная высота снежного покрова на лесных участках

Станция	Высота, см	P%	Станция	Высота, см	P%
удож	87	1,2	Сосново	55	52,0
яндусельга (лес)	77	3,5	Крестцы	55	53,9
индозеро	76	5,6	Паданы	54	56,2
синъярем	76	7,7	Охоны (лес)	54	58,1
еребовская	75	9,6	Тихвин	53	60,2
ледвежьегорск	73	11,6	Будогощь	52	62,0
яндусельга (поляна)	72	13,6	Девкино	52	64,2
ридино	70	15,7	Осиповец	51	66,3
Ошкозеро	70	17,7	Новая Ладога	51	68,2
Тильдозеро	67	19,6	Николаевское	49	70,1
Андропова Гора	67	21,8	Выборг	46	72,2
Раз-Наволоок	66	23,7	Хвойная	46	74,3
Сумский Посад	66	25,8	Анашкино	43	76,2
Суоярви	66	27,9	Приозерск	42	78,3
Тоньгома	64	29,8	Кингисепп (лес)	41	80,2
Калевала	64	31,8	Ляды	41	82,3
Воренжа	64	33,7	Сестрорецк	40	84,4
Кужмуй	63	35,9	Старое Гарколово	39	86,3
Лесогорский	63	37,9	Пыталово	39	88,4
Охоны (поляна)	62	39,8	Дно	38	90,5
Веребья	61	41,9	Кингисепп (поляна)	37	92,4
Вокнаволоок	60	43,8	Толмачево	37	94,5
Шахтинполье	60	46,0	Белогорка	36	96,6
Пугозеро	58	48,1	Опочка	31	98,5
Рошино	57	50,0			

соответственно 170 и 156 мм. Однако различия по числу дней
 с метелями являются существенными (в Данилово — 37, в Порхо-
 ве — 18). На лесных участках наибольшая высота снежного по-
 крова (87 см) отмечается на ст. Пудож (Карелия), а наименьшая
 (31 см) — в Опочке (Псковская область). Количество осадков

на станциях соответственно 194 и 172 мм за холодный период, а число дней с метелями 34 и 18. Из предварительного анализа следует, что при прочих равных условиях важная роль в распределении снежного покрова принадлежит метелевой деятельности (снег переносу).

Полученную амплитуду можно разбить на интервалы, или градации, и подсчитать число попаданий высоты снежного покрова в каждую градацию. Число градаций определяется как объем

Таблица 4

Распределение эмпирических повторяемостей и обеспеченностей средней максимальной высоты снежного покрова на территории Северо-Западного УГМС на полевых участках

Характеристика	Интервал, см				
	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70
Повторяемость (число случаев)	24	23	29	12	5
Повторяемость (%)	25,80	24,73	31,20	12,90	5,37
Обеспеченность (число случаев)	24	47	76	88	93
Обеспеченность (%)	25,80	50,53	81,73	94,63	100

Таблица 5

Распределение эмпирических повторяемостей и обеспеченностей средней максимальной высоты снежного покрова на территории Северо-Западного УГМС на лесных участках

Характеристика	Интервал, см					
	31—40	41—50	51—60	61—70	71—80	81—90
Повторяемость (число случаев)	8	7	13	14	16	1
Повторяемость (%)	16,33	14,28	26,53	28,60	12,22	2,00
Обеспеченность (число случаев)	8	15	28	42	48	49
Обеспеченность (%)	16,33	30,61	57,14	85,74	97,96	100

данных, так и требованиями, предъявляемыми практикой к информации о снежном покрове. Например, при высоте снежного покрова 10 см и более начинается так называемый «санный путь», а высота снежного покрова на полях 20 см и более гарантирует защиту озимых от вымерзания и т. д.

Располагая данными высоты снежного покрова (табл. 2 и 3) для полевых и лесных участков, выделим соответственно 5 и 6 градаций (табл. 4 и 5) определим число попаданий высоты покрова в каждую градацию.

Суммы случаев по всем градациям равны числу станций, где производятся снегомерные съемки (поле — 93, лес — 49). Из при

енных данных следует, что наиболее часто на территории Северо-западного УГМС наблюдаются высоты снежного покрова на полевых участках в интервале 41—50 см, а на лесных — 50—70 см. Добные таблицы в математической статистике принято называть блицами эмпирического распределения. Зная абсолютные частоты, можно определить распределение относительных частот; по-довательное суммирование позволяет получить относительные абсолютные накопленные частоты. Данные, помещенные в табл. 1 5, можно представить и графически. При этом на оси ординат

Таблица 6

рактические характеристики распределения средней максимальной высоты снежного покрова на территории Северо-Западного УГМС на полевых и лесных участках

Участок	Число станций	Высота, см			A	σ	μ см	δ %	c_v	A_s
		средняя	наибольшая	наименьшая						
поле	93	40	64	23	41	11	1,14	3	0,27	+0,23
лес	49	56	87	31	56	13	1,85	3	0,23	+0,12

кладывают градации, а на оси абсцисс — соответствующие относительные частоты (гистограмма) или относительные накопленные частоты (кумулятивная кривая). Применение даже простейших приемов математической статистики позволяет систематизировать в более наглядную форму исходную обширную информацию о снежном покрове и выявлять некоторые особенности его распределения в пределах рассматриваемой территории. Однако при решении многих задач требуются подробные сведения о пространственной структуре поля снежного покрова.

Для описания пространственной структуры поля снежного покрова на территории Северо-Западной УГМС воспользуемся общепринятыми характеристиками распределения: средними, мерами рассеивания и показателями симметричности.

Средние значения, как известно, описывают некоторые свойства распределения снежного покрова, но не являются исчерпывающими характеристиками, так как нередко имеет место случай, когда средние равны между собой, а характер рассеивания относительно редких будет различный.

В табл. 6 помещены характеристики распределения снежного покрова на полевых и лесных участках: A — амплитуда, или размах варьирования; σ — среднее квадратическое отклонение; μ — абсолютная ошибка среднего арифметического; δ — относительная ошибка; c_v — коэффициент вариации; A_s — коэффициент асимметрии.

Методика расчета приведенных выше характеристик распределения достаточно подробно изложена в ряде работ [11, 1]. В расчетах нами использованы известные формулы:

$$A = h_{\text{макс}} - h_{\text{мин}},$$

где h — высота снежного покрова;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(h_i - \bar{h})^2}{n}},$$

где h_i — высота снежного покрова отдельной станции, $\bar{h}$ — средняя высота, n — число станций;

$$\mu = \frac{\sigma}{\sqrt{n}};$$

$$\delta = \frac{\mu}{\bar{h}} \cdot 100\%;$$

$$c_v = \frac{\sigma}{\bar{h}};$$

$$A_s = \frac{\sum(h_i - \bar{h})^3}{n \sigma^3}.$$

Для выявления сомнительных значений высоты снежного покрова на отдельных станциях было использовано отношение

$$\frac{h_i - \bar{h}}{\sigma}.$$

Для расчетов обеспеченности высоты снежного покрова на каждой станции (см. табл. 2 и 3) была использована известная формула

$$P = \frac{m - 0,3}{n + 0,4} \cdot 100\%,$$

где P — процентная обеспеченность (суммарная вероятность $m = 1, 2, 3 \dots$ — порядковые номера станций, расположенных в убывающем порядке; n — общее число членов ряда (станций)).

Таблица 6 дает наглядное представление о характере распределения высоты снежного покрова в пределах рассматриваемой территории. Различия средних квадратических отклонений на полевых (11) и лесных (13) участках, в отличие от амплитуды, по своему абсолютному значению невелики. Аналогичная картина отмечается и при сопоставлении значений безразмерной характеристики изменчивости, т. е. коэффициента вариации.

Как известно, при нормальном распределении или близко к нормальному коэффициент асимметрии приближается к нулю. В нашем примере (табл. 6) значения коэффициента асимметрии на полевых (+0,23) и лесных (+0,12) участках незначительны, т. е. влияние асимметрии практически не скажется на погрешности определения средней высоты снежного покрова по площади. Отно-

ельная погрешность средней высоты снежного покрова как полевых, так и на лесных участках составляет около 10%, т. е. не превышает возможной погрешности исходных данных.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в табл. 2 и 3 обеспеченность (P), равная 50%, приходится на порядковый номер, соответственно на полевых участках — 47, а на лесных — 25. При таком объеме исходных данных (поле — 93 станции, лес — 25 станций) распределение высоты снежного покрова на территории Северо-Западного УГМС можно считать близким к нормальному.

Приведенные выше характеристики отражают пространственную структуру снежного покрова в пределах рассматриваемой территории.

Как известно, в климатологических исследованиях при анализе и обобщении характеристик климата широкое распространение получил метод номограмм [9, 10].

Метод номографирования, особенно разработанный А. Н. Лебедевым [9], включает несколько этапов: анализ исходной информации, расчет обеспеченности для каждого члена ряда, построение интегральной кривой, расчет обеспеченностей по соответствующим градиентам и определение характеристик распределения.

Применительно к анализу и обобщению исходной информации по снежному покрову этот метод использовался недостаточно. Воспользуемся методикой расчета вероятностных характеристик [9] при обобщении данных распределения средней максимальной высоты снежного покрова на примере Северо-Западного УГМС.

Располагая данными средней многолетней высоты снежного покрова и суммарной вероятности (обеспеченности) по станциям (см. табл. 2 и 3), можно построить эмпирические интегральные кривые отдельно для полевых и лесных районов (рис. 1). С кривых снимаются соответственно значения различной обеспеченности (5, 10, 20, ..., 95%) и вписываются в таблицу (табл. 7). Они являются исходным материалом для построения номограммы (рис. 2). При этом по оси ординат откладывается средняя многолетняя высота снежного покрова, а по оси абсцисс — возможные ее значения. Наклонные линии — линии, характеризующие одинаковую обеспеченность. Чем больше изменчивость высоты снежного покрова по территории, тем больше наклон линий равной обеспеченности к оси ординат и тем меньше их плотность (сгущение).

Рис. 1. Кривая распределения высоты снежного покрова.

1 — поле, 2 — лес.

Средняя максимальная высота снежного покрова (см) различной обеспеченности на территории Северо-Западного УГМС на полевых и лесных участках

Участок	Средняя	Наибольшая	Обеспеченность, %										Наименьшая	
			5	10	20	30	40	50	60	70	80	90		95
Поле	40 (Колежма)	64 (Данилово)	60	56	50	47	43	40	37	32	28	25	24	23 (Порхов)
			78	73	68	65	61	57	53	48	43	37	34	
Лес	56 (Роцино)	87 (Пудож)	78	73	68	65	61	57	53	48	43	37	34	31 (Опочка)

Средние высоты снежного покрова в полевых и лесных районах совпадают соответственно с 50%-ной обеспеченностью, т. е. распределение покрова в поле и в лесу является симметричным и приближается к нормальному закону.

Номограммы позволяют получить характеристики распределения высоты снежного покрова заданной обеспеченности для всех станций Северо-Западного УГМС, если известны их средние многолетние значения. Для станций, где не проводятся снегомерные наблюдения, среднюю многолетнюю высоту можно определить путем интерполяции между соседними станциями, имеющими необходимую информацию. Пользуясь номограммой, можно легко определить характеристики распределения снежного покрова на местности ($\bar{h}$, σ , c_v и др.).

рис. 2. Номограмма для расчета высоты снежного покрова различной обеспеченности.

а — поле, б — лес.

Сравнение показывает, что различия между данными, сняты с номограмм и вычисленными по соответствующим формулам, являются существенными (табл. 8).

Пространственная изменчивость средней максимальной высоты снежного покрова как на полевых, так и на лесных участках и погрешности средних практически одинаковы, что позволяет выполнять расчеты различной обеспеченности в целом для всей территории Северо-Западного УГМС, используя параметры кривых распределения для поля и леса.

Построенные номограммы отражают не только средние условия распределения максимальной высоты снежного покрова по территории, но и могут быть использованы при изучении зим люб

Таблица

Характеристики распределения высоты снежного покрова (см) на территории Северо-Западного УГМС

Участок	По формулам			С интегральной кривой		
	$\bar{h}$	σ	c_v	$\bar{h}$	σ	c_v
Поле	40	11	0,27	40	12	0,30
Лес	56	13	0,23	57	14	0,25

снежности. В малоснежные зимы, когда изменчивость высот снежного покрова сравнительно велика, общая кривая обеспеченности, по-видимому, нуждается в уточнении.

Таким образом, приведенные выше приемы математической статистики в виде таблиц, графиков и номограмм позволяют систематизировать и обобщить в более наглядную и компактную форму обширную исходную информацию о распределении снежного покрова и выявить закономерности его формирования.

Материалы 142 станций представляется возможным обобщить в виде двух номограмм, отражающих пространственную структуру поля снежного покрова в пределах рассматриваемой территории. Получены характеристики распределения средней максимальной высоты снежного покрова.

Выполненный анализ данных показывает, что распределение снежного покрова в пределах Северо-Западного УГМС подчиняется нормальному закону.

В заключение заметим, что метод номографирования может успешно применяться при изучении пространственно-временной структуры поля снежного покрова, при анализе и обобщении обширной исходной информации о распределении характеристик снежного покрова в других управлениях Гидрометслужбы нашей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Г. А. Методы оценки случайных погрешностей гидрометеорологической информации. Л., Гидрометеоздат, 1975. 96 с.
2. Вершинина Л. К., Волченко В. Н. Максимальные запасы в снежном покрове в районах Северо-Запада ЕТС.— «Тр. ГГИ», 1974, вып. 214, 47—53.
3. Гандин Л. С., Каган Р. Л. О точности определения средней высоты снежного покрова по дискретным данным.— «Тр. ГГО», 1962, вып. 130, с. 3—10.
4. Гольцберг И. А. Составление таблиц вероятностей различных метеорологических элементов.— «Тр. ГГО», 1958, вып. 85, с. 102—112.
5. Дроздов О. А. О свойствах интегрально-разностных кривых.— «Тр. ГГО», 1964, вып. 162, с. 3—17.
6. Иванов Н. Н. Кривые обеспеченности осадками для степной и лесостепной полосы Европейской территории СССР.— «Уч. зап. ЛГПИ», 1948, т. 73, 109—128.
7. Кобышева Н. В. Косвенные расчеты климатических характеристик. Л., Гидрометеоздат, 1971. 191 с.
8. Копанев И. Д. Методы изучения снежного покрова. Л., Гидрометеоздат, 1971. 228 с.
9. Лебедев А. Н. Обоснованные номограммы климатических элементов.— «Тр. ГГО», 1964, вып. 163, с. 93—103.
10. Логвинов К. Т., Бабиченко В. Н., Кулаковская М. Ю. Частые явления погоды на Украине. Л., Гидрометеоздат, 1972. 236 с. («Труды НИИ ГМИ», вып. 110).
11. Рождественский А. В., Чеботарев А. И. Статистические методы гидрологии. Л., Гидрометеоздат, 1974. 424 с.
12. Сапожникова С. А. Расчет повторяемости минимальных температур Европейской территории СССР.— «Тр. НИИАК», 1961, вып. 12, с. 16—23.
13. Справочник по климату СССР. Ч. IV, вып. 3. Л., Гидрометеоздат, 1968. 1 с.
14. Черкавский С. К. Об эффективности гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства.— «Метеорология и гидрология», 1973, № 12, с. 93—97.

И. Д. КОПАН

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА В РАЙОНАХ ЕТС, ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И КАЗАХСТАНА

Из всех существующих методов измерения характеристик снежного покрова широкое распространение получил метод снегомерных съемок, который много лет используется на сети и оправдывает себя, так как обеспечивает в основном запросы практики необходимой информацией о снежном покрове.

В настоящее время в практику научно-исследовательских работ прочно входят аэрометоды (аэрофотосъемки, гамма-съемки и др.) и космические методы, в том числе и метеорологические спутники.

Метод самолетной гамма-съемки, разработанный Институтом прикладной геофизики [4], основан на учете эффекта поглощения снегом естественного гамма-излучения Земли, измеренного аппаратурой, установленной на самолете, на исследуемом маршруте в периоды залегания снежного покрова и при его отсутствии. Эффект естественного ослабления гамма-излучения Земли зависит не только от количества воды, содержащейся в снежном покрове, а и от влагозапасов верхних слоев почвогрунтов. Метод позволяет проводить двухкратные измерения в определенный момент времени определять приращение снегозапасов за соответствующий отрезок времени. При этом полученный результат измерений является средним по некоторой полосе, ширина которой определяется высотой полета. Например, при высоте полета 25—75 м ширина съемочной полосы составляет 100—250 м [4].

Одним из важных источников получения глобальной информации являются метеорологические спутники. Накопленные данные позволили выполнить важные обобщения по распределению облачности, построить карты планетарного облачного покрова, а также получить характеристики радиационного баланса Земли [5]. Начаты работы в различных направлениях по использованию телевизионных космических снимков для изучения снежного покрова

Космические съемки позволяют с наибольшей оперативностью гавлять карты границ распространения снежного покрова поч- в единый физический момент в планетарном масштабе. Анализ евизсионных снимков позволяет выделить районы с устойчивым устойчивым залегаем снежного покрова. Определить высоту жного покрова в том или ином районе по снимкам пока не пред- вляется возможным [7].

Таблица 1

Повторяемость (%) высоты снежного покрова на полевых участках

УГМС	Число станций	Интервал, см								
		<10	11— —20	21— —30	31— —40	41— —50	51— —60	61— —70	71— —80	≥81
рманское	14				2	4	6	2		
зеро-Западное	93			24	23	29	12	5		
верное	115		1	4	20	27	32	22	8	1
гвийской ССР	81		15	38	21	6	1			
гонской ССР	65		9	44	11	1				
товской ССР	78		42	45	1					
лорусской ССР	155		60	83	12					
рхне-Волжское	187			16	44	42	61	20	4	
ральское	124			18	38	36	17	11	3	1
раинской ССР	379	14	283	51	19	8	3	1		
нтрально-Черноземных об- ластей	59		8	48	3					
иволжское	149		1	46	71	23	7	1		
веро-Кавказское.	96	2	83	11						
ское	70		3	21	19	18	7	2		
падно-Сибирское	172	1	10	49	46	29	2	7	2	8
захской ССР	208	8	84	77	16	8	6	1	5	3

Имеются основания надеяться, что совершенствование методов космических съемок позволит значительно расширить возможности пользования телевизионных снимков при исследовании снежного покрова, его пространственно-временной динамики в глобальных спектах.

В дальнейшем при обработке и анализе результатов самолетной аэро-съемки и космических съемок в качестве эталона, по-види- ому, будут широко использоваться данные площадных наземных негомерных наблюдений.

В настоящей статье представлены результаты расчетов вероят- остных площадных характеристик снежного покрова для 17 ГМС, расположенных в пределах ЕТС, Западной Сибири и Ка-

Повторяемость (%) высоты снежного покрова на лесных участках

УГМС	Число станций	Интервал, см							
		20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70	71—80	81—90
Мурманское	29					2	11	11	3
Северо-Западное	49			8	7	13	14	6	1
Северное	50						12	16	12
Латвийской ССР	37	1	18	17	1				
Эстонской ССР	33		9	22	2				
Литовской ССР	9	1	7	1					
Белорусской ССР	64		22	27	14	1			
Верхне-Волжское	53				5	7	18	18	2
Уральское	53				5	28	13	5	6
Украинской ССР	51	5	34	10	1	1			
Центрально-Черноземных областей	15		1	10	4				
Приволжское	15				1	2	9	1	2
Северо-Кавказское	8	2		2	3	1			
Омское	52			1	3	12	17	11	7
Западно-Сибирское	64			5	2	10	21	17	5
Казахской ССР	5			1	1	1	2		

захстана. При этом были использованы средние многолетние данные о максимальной высоте снежного покрова за период 1935-1964 гг., помещенные в «Справочнике по климату СССР» [12].

Поскольку распределение снежного покрова существенным образом зависит от особенностей подстилающей поверхности (условий защищенности), то оценка вероятностных характеристик высоты покрова на полевых и лесных участках производилась отдельно для каждого УГМС.

При расчетах использовался материал снегомерных съемок на полевых участках по 2138 станциям, на лесных — по 613 станциям. При обработке, анализе и обобщении данных о высоте снежного покрова был применен вероятностный метод математической статистики, подробно изложенный в ряде работ [9—11]. Чтобы иметь общее представление о характере распределения снежного покрова на рассматриваемой территории, можно для большей наглядности всю обширную информацию (2751 станция) представить в виде повторяемостей отдельно для полевых и лесных участков соответствующего УГМС.

На основании данных табл. 1 и 2 представляется возможным определить обеспеченность ($P\%$) распределения высоты снежного

рова на Европейской территории СССР на полевых и лесных участках по данным станций 14 УГМС (табл. 3).

Таблица 3

Обеспеченность (%) распределения высоты снежного покрова на ЕТС

часток	Число станций	Интервал, см										
		101—110	91—100	81—90	71—80	61—70	51—60	41—50	31—40	21—30	11—20	<10
е	1688		0,1	0,2	1,1	4,8	13,1	24,5	43,5	69,4	99,1	100
	492	1,8	4,6	9,4	21,1	38,6	49,6	59,6	79,5	98,2	100	

Таблица 4

Вероятностные характеристики распределения высоты снежного покрова на полевых участках

УГМС	Средняя	Наибольшая	Обеспеченность, %							Наименьшая
			5	10	25	50	75	90	95	
рманское	51	70	70	65	56	51	45	38	35	35
веро-Западное	40	64	60	56	48	40	30	25	24	23
верное	52	77	73	69	61	52	42	35	31	20
гвийской ССР	28	46	45	40	33	58	22	19	17	14
тонской ССР	26	37	35	33	30	26	23	19	17	16
товской ССР	20	36	29	26	23	20	28	15	14	12
юрусской ССР	23	37	32	30	27	23	18	16	15	14
рхне-Волжское	48	77	66	62	57	48	38	31	28	25
альское	44	77	68	62	52	43	34	29	26	22
раинской ССР	18	62	37	28	20	17	15	13	11	8
нтрально-Черноземных областей	24	33	31	29	26	24	22	21	19	16
иволжское	35	58	51	47	39	34	29	26	25	20
веро-Кавказское	16	26	25	22	19	16	14	12	11	10
ское	37	61	55	52	45	38	28	24	21	18
падно-Сибирское	40	88	80	60	48	40	26	21	17	10
захской ССР	24	55	54	42	25	23	16	12	11	7

Процентная обеспеченность (суммарная вероятность) P рассчитывалась по известной формуле

$$P = \frac{m - 0,3}{n + 0,4} \cdot 100\%,$$

где m — порядковый номер числа ряда, n — число наблюдений (станций) в ряду.

Таблиц

Вероятностные характеристики распределения высоты снежного покрова на лесных участках

УГМС	Средняя	Наибольшая	Обеспеченность, %							Н
			5	10	25	50	75	90	95	
Мурманское	73	92	91	88	79	72	66	62	57	5
Северо-Западное	56	87	78	73	66	57	45	37	34	3
Северное	81	104	103	97	88	79	70	66	64	6
Латвийской ССР	30	50	39	36	33	29	26	22	21	2
Эстонской ССР	32	43	41	38	34	32	29	26	24	2
Литовской ССР	26	40	39	36	27	26	22	20	19	1
Белорусской ССР	34	51	48	46	40	34	27	23	22	2
Верхне-Волжское	68	92	89	84	75	68	61	50	45	4
Уральское	69	102	110	95	77	68	57	50	46	4
Украинской ССР	27	42	40	38	30	26	21	20	18	1
Центрально-Черноземных областей	38	48	47	45	41	38	33	29	27	2
Приволжское	68	93	91	84	73	68	62	54	49	4
Северо-Кавказское	40	69	68	66	50	40	28	18	18	1
Омское	67	92	89	85	72	66	60	51	46	3
Западно-Сибирское	69	122	96	85	72	68	59	47	37	3

Не вдаваясь в анализ данных табл. 1, 2 и 3, отметим, что приведенные характеристики отражают фоновую пространственную структуру распределения снежного покрова на огромной территории. Применение даже простейших приемов математической статистики позволяет систематизировать в более наглядную и компактную форму исходную обширную информацию о снежном покрове и выявить некоторые особенности его распределения.

Для решения многих практических и научных задач требуются анализированные и обстоятельные сведения о пространственной структуре поля снежного покрова.

Располагая данными о суммарной вероятности, вычисленной по формуле (1), и о средней многолетней высоте снежного покрова по индиям каждого УГМС, можно построить эмпирические интегральные кривые раздельно для полевых и лесных участков. С построенных кривых снимаются соответственно значения различной обеспеченности и вписываются в табл. 4 и 5.

Таблицы 4 и 5 содержат сведения о вероятностных характеристиках снежного покрова для различных элементов ландшафта. Вероятностная (прогностическая) информация может быть полезной при планировании многих хозяйственных мероприятий (снеголиоративных, снегозадержания на автомобильных и железных дорогах и т. д.).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на рассматриваемой территории как на полевых, так и на лесных участках каждого УГМС (табл. 4 и 5) средняя высота снежного покрова совпадает с 50%-ной обеспеченностью, т. е. распределение снежного покрова является почти симметричным и приближается к нормальному. Это в известной мере подтверждает вывод [1], полученный на основе обработки и анализа большого материала площадных снегоисъемок, выполненных во время экспедиционных работ, том, что распределение снежного покрова в подавляющем большинстве случаев подчиняется нормальному закону.

Для большей наглядности данные, помещенные в табл. 4 и 5, можно представить графически, т. е. в виде номограмм [9]. При этом по оси ординат откладывается средняя многолетняя высота снежного покрова, а по оси абсцисс — возможные ее значения.

В качестве примера на рис. 1 приведены номограммы, построенные для полевых участков УГМС Белорусской ССР, УГМС Центрально-Черноземных областей и Омского УГМС.

Однотипность распределения вероятностных характеристик высоты снежного покрова позволяет построить обобщенную номограмму, например для Европейской территории СССР, на основе данных соответствующих УГМС. На рис. 2 приведена обобщенная номограмма распределения высоты снежного покрова на ЕТС для полевых участков. Сравнительно невысокое сгущение линий одинаковой обеспеченности обусловлено большой пространственной изменчивостью высоты снежного покрова на рассматриваемой территории.

Основанием для построения обобщенной номограммы может служить в какой-то мере то обстоятельство, что в северных районах ЕТС имеет место раннее формирование снежного покрова и позднее его разрушение, а в южных районах — позднее формирование и раннее разрушение. На значительной территории ЕТС максимальная высота снежного покрова приходится на март. В районах с продолжительным холодным периодом максимум

отмечается в апреле, а на юге ЕТС — в феврале. Например, средняя максимальная высота снежного покрова в Ростовской и Ворошиловградской областях составляет 16—18 см. Такая же высота наблюдается в Мурманской и Архангельской областях в декабре, а в Московской области в январе. Средняя максимальная высота снежного покрова (24 см) в Центральном Казахстане соответствует средней за январь высоте в Ленинградской области, а максимальная высота (37 см) в Омской области соответствует средней за январь в Мурманской области.

Изменения высоты снежного покрова в северных районах ЕТС в течение зимы отражают как бы динамику снежного покрова в пределах всей рассматриваемой территории.

рис. 1. Номограмма для расчета высоты снежного покрова различной обеспеченности на территории УГМС Белорусской ССР (а), УГМС Центрально-Черноземных областей (б) и Омского УГМС (в). Поле.

Номограммы позволяют получить характеристики распределения высоты снежного покрова заданной обеспеченности для всех станций соответствующих УГМС, если известны средние многолетние значения высоты. В табл. 4 и 5 приведены данные о высоте снежного покрова, полученные в результате осреднения для каждого УГМС, раздельно для полевых и лесных участков. В связи с этим возникает необходимость в оценке погрешности определения средней высоты снежного покрова по площади.

Как известно, общая ошибка определения средней на соответствующей площади складывается из ошибок в отдельных пунктах (станциях) и ошибок обобщения ее значений для всего района. Зачастую ошибки измерения в разных пунктах могут компенсироваться и при достаточно большом числе пунктов наблюдений в пределах рассматриваемого района не достигают большой величины [11].

Используя приемы математической статистики, ряд авторов имели возможность оценить погрешность данных снегомерных наблюдений по постоянным рейкам: на снегомерном маршруте и на некоторой площади.

Так, например, на Европейской территории СССР относительная погрешность измерения высоты снежного покрова по постоянным рейкам на защищенных участках возрастает с севера на юг от 3—4% в лесной зоне до 7% в степных районах [3].

Ошибки измерения высоты снежного покрова посредством съемок на большей части ЕТС при средних значениях коэффициента вариации 0,40—0,60 составляют 4—6% при $n=100$ и 3—4% при $n=200$ [8], где n — число промерных точек. Ошибки определения максимальных снегозапасов на маршруте для северных районов ЕТС составляют 5—6%, а для центральных и южных — 7—8% [1, 2]. При этом коэффициент вариации колеблется на полевых участках в северных районах от 0,20 до 0,40 в центральных и южных районах — от 0,30 до 0,60. На лесных участках коэффициент вариации изменяется от 0,10 до 0,20 [1].

Рис. 2. Номограмма для расчета высоты снежного покрова различной обеспеченности на территории ЕТС. Поле.

Точность определения средней высоты в пределах некоторой площади также зависит от числа промерных точек (пунктов наблюдений), равномерности их размещения и степени изменчивости характеристик снежного покрова по территории.

В связи с определением погрешности средней высоты снежного покрова на площади соответствующей УГМС раздельно для полевых и лесных участков были выполнены расчеты, результаты которых помещены в табл. 6 и 7, где n — число станций; h — средняя высота снежного покрова; A — амплитуда, т. е. разность между наибольшим и наименьшим значениями высоты снежного покрова; σ — среднее квадратическое отклонение; c_v и A_s — соответственно коэффициенты вариации и асимметрии; μ и σ — стандартная (см) и относительная (%) ошибки средней. В табл. 7 приведено также соотношение между высотой снежного покрова на лесных ($h_{л}$) и полевых ($h_{п}$) участках.

Методика расчета приведенных характеристик распределения достаточно подробно изложена в ряде работ [10, 11], и, по-видимому, нет надобности приводить здесь расчетные формулы. Все

Таблица 6

Характеристики распределения высоты снежного покрова на полевых участках

УГМС	Пло- щадь, тыс. км ²	n	h	A	σ	c_v	A_s	μ	$\sigma \%$
Арманское	139,1	14	51	35	9	0,18	0,07	2,0	4
Веро-Западное	393,3	93	40	41	11	0,27	0,23	1,1	3
Верное	1146,2	115	52	57	13	0,25	0,04	1,3	2
Гврийской ССР	64,5	81	28	32	8	0,29	0,16	0,9	3
Гонской ССР	45,1	65	26	21	5	0,19	0,05	0,6	2
Говской ССР	65,2	78	20	24	4	0,20	0,48	0,4	2
Дорусской ССР	207,6	155	23	23	5	0,22	0,28	0,4	2
Дрхне-Волжское	359,8	187	48	52	12	0,26	0,09	0,8	2
Дальское	666,4	124	44	55	13	0,30	0,17	1,2	3
Драинской ССР	602,6	379	18	54	6	0,30	—	0,3	2
Днтрально-Чер- ноземных облас- тей	204,9	59	24	17	4	0,17	0,35	0,5	2
Диволжское	413,2	149	35	38	8	0,23	0,34	0,7	2
Дверо-Кавказ- ское	574,9	96	16	16	4	0,34	0,38	0,4	3
Дское	1502,3	70	37	43	12	0,28	0,12	1,5	4
Днадно-Сибир- ское	850,2	172	40	78	15	0,38	0,18	1,1	3
Дзахской ССР	2753,2	208	24	48	9	0,38	0,37	0,7	3

и трудоемкие расчеты были выполнены вручную, хотя характеристики распределения (h , σ и c_v) можно легко получить с помощью интегральных кривых или номограмм. Для сравнения были подсчитаны характеристики распределения высоты снежного покрова с помощью расчетных формул и интегральных кривых (номограмм).

Из данных, приведенных в табл. 6 и 7, следует, что как на полях, так и на лесных участках высота снежного покрова убывает с севера на юг от 50—70 до 15—25 см и возрастает с запада на восток от 25—35 до 50—70 см. Как и следовало ожидать, повсюду высота снежного покрова на лесных массивах больше, чем в поле, среднем в 1,5 раза. Исключением является Прибалтика и Северный Кавказ. Различия между полевыми и лесными участками тем больше, чем меньше абсолютная высота снежного покрова, характерная для данного района.

Если на открытой местности при прочих равных условиях важная роль в распределении снежного покрова принадлежит метелевому снегопереносу, ветру и турбулентному трению, то в лесных

Характеристики распределения высоты снежного покрова на лесных участках

УГМС	n	h	A	σ	c_{σ}	A_s	μ	$\sigma\%$	$\frac{h}{n}$
Мурманское	29	73	37	10	0,13	0,05	1,5	2	1,4
Северо-Западное	49	56	56	13	0,23	0,12	1,8	3	1,4
Северное	50	81	43	14	0,17	0,02	1,4	2	1,4
Латвийской ССР	37	30	30	5	0,17	0,20	0,8	3	1,0
Эстонской ССР	33	32	19	4	0,12	0,27	0,6	2	1,5
Литовской ССР	9	26	21	—	—	—	—	—	1,3
Белорусской ССР	64	34	30	10	0,28	0,10	1,2	3	1,4
Верхне-Волжское	53	68	51	12	0,25	0,12	1,6	3	1,4
Уральское	53	69	68	15	0,22	0,10	1,6	3	1,4
Украинской ССР	51	27	26	7	0,26	0,28	1,0	3	1,5
Центрально-Чернозем- ных областей	15	38	21	5	0,13	0,27	0,9	3	1,5
Приволжское	15	68	44	10	0,15	—	2,5	3	1,9
Северо-Кавказское	8	40	41	16	0,40	—	—	—	2,5
Омское	52	67	53	12	0,18	0,14	1,6	2	1,8
Западно-Сибирское	64	69	86	14	0,20	0,19	1,7	3	1,7

районах важным фактором, определяющим формирование снежного покрова, являются полнота и состав леса.

В северных районах ЕТС, характеризующихся большим метельным переносом, процессы переноса и отложения снега приблизительно уравниваются друг друга благодаря относительно одной образной подстилающей поверхности. Наибольшие значения амплитуды (размаха варьирования) приурочены в основном к районам с интенсивным метельным снегопереносом [6].

Существующие карты снежного покрова СССР построены либо по данным снегомерных съемок станций, расположенных в условиях открытой местности, либо по данным постоянных рек, установленных на защищенных участках.

В большинстве выполненных работ отмечается четко выраженное закономерное распределение снежного покрова, его изменение как в широтном, так и в меридиональном направлениях. В действительности же вследствие большого разнообразия природных условий распределение снежного покрова носит довольно сложный характер.

Картирование, основанное на использовании материалов только по защищенным участкам или по полевым в отдельности, дает лишь одностороннее представление о распределении снежного

крова по территории, т. е. при таком картировании не представляется возможным учесть все особенности пространственной структуры поля снежного покрова. Это можно осуществить при использовании вероятностного метода анализа и обобщения данных. Преимущества вероятностного метода заключаются в том, что при обобщении он включает в себя всю статистическую совокупность ходной информации, отдельные значения даются в увязке со средней многолетней величиной. Приведенные выше номограммы и характеристики распределения в табл. 6 и 7 содержат полную информацию о пространственной структуре поля снежного покрова в пределах рассматриваемой территории. Они позволяют выявить одноплотность в распределении высоты снежного покрова как на полях, так и на лесных участках, а также позволяют судить, сколько существующая плотность снегомерной сети станций и стов обеспечивает получение средних площадных характеристик заданной погрешностью. Вероятностный метод вполне приемлем и для разработки рекомендаций, связанных с рационализацией и оптимизацией размещения снегомерной сети.

Таблицы 6 и 7 показывают, что средние квадратические отклонения (σ) поле — лес имеют незначительные различия, причем σ на полевых участках зачастую меньше по своему абсолютному значению σ в лесу. Зато значения коэффициента вариации (c_v) на лесных участках, как правило, больше, чем в лесу. Значения коэффициента вариации высоты снежного покрова изменяются в больших пределах в зависимости от типа ландшафта (залесенности) и условий формирования покрова. С увеличением высоты снежного покрова коэффициент вариации убывает, что соответствует равномерному распределению снежного покрова на местности.

Значения коэффициента асимметрии (A_s) как на полевых, так и на лесных массивах по своему абсолютному значению малы. Это является важным признаком того, что распределение снежного покрова по территории всех рассматриваемых УГМС приближается к нормальному.

Погрешности определения средней высоты снежного покрова (δ) по площади как на полевых, так и на лесных участках рассматриваемой территории невелики и не превышают возможной погрешности определения исходной средней, полученной путем снегомерных съемок [8].

Выполненные расчеты показывают, что существующая плотность снегомерной сети во всех УГМС обеспечивает достаточную точность определения средней высоты снежного покрова по площади для удовлетворения многих практических запросов. Следует отметить, что, пользуясь кривыми обеспеченности или номограммой, можно легко определить h , σ и c_v . Сравнение показывает, что различия между данными, снятыми с номограммы и вычисленными по соответствующим расчетным формулам, практически одинаковы, что исключает трудоемкие расчеты характеристик распределения снежного покрова.

Пространственная изменчивость максимальной высоты снежного покрова, погрешности определения средних как на полях так и на лесных участках повсюду почти одинаковы, что позволяет выполнять расчеты различной обеспеченности в целом на территории каждого УГМС, используя параметры кривых распределения, полученные для полевых и лесных участков.

Как известно, ежедневные наблюдения над высотой снежного покрова по постоянным рейкам на гидрометеорологической сети в нашей стране были начаты с 1891 г. В «Справочнике по климату СССР» помещены средние многолетние значения высоты снежного покрова на защищенных и открытых участках за период 1891

Таблица

Характеристики распределения высоты снежного покрова по данным постоянных реек (Р) и снегоъемок (С)

УГМС		n	h	A	σ	c_v	μ	σ
Открытые участки (поле)								
Белорусской ССР	Р	210	22	23	5	0,22	0,4	
	С	155	23	23	5	0,22	0,4	
Омское	Р	70	33	42	10	0,30	1,2	
	С	70	37	43	12	0,28	1,5	
Защищенные участки (лес)								
Белорусской ССР	Р	70	31	28	7	0,22	0,8	
	С	64	34	30	10	0,28	1,2	
Омское	Р	39	62	48	12	0,19	2,0	
	С	52	67	53	12	0,18	1,6	

1964 гг. Возникает вопрос о возможностях использования этих данных при расчетах площадных характеристик снежного покрова. Вычисленные характеристики распределения максимальной высоты снежного покрова по площади по данным постоянных реек для УГМС Белорусской ССР, УГМС Центрально-Черноземных областей и Омского УГМС помещены в табл. 8, где для сравнения приведены данные снегоъемок.

Из таблицы следует, что для больших территорий данные снегоъемок и постоянных реек хорошо согласуются между собой и дают удовлетворительные результаты вследствие осреднения данных большого числа станций и постов.

Начиная с зимы 1965—66 г. был осуществлен переход на новую методику, основой которой является ландшафтно-маршрутный принцип производства снегоъемок на гидрометеорологической сети. При этом возникает вопрос о связи данных наблюдений новой методике с данными наблюдений по старой методике

1963—1966 гг. в ряде УГМС были проведены параллельные съемки по методике, разработанной в ГГИ.

Расчеты показали, что треугольный маршрут (с периметром км) по сравнению с ландшафтным маршрутом, как правило, дает заниженные характеристики снежного покрова в среднем на 7% для значительной части равнинной территории страны, погрешности исходных данных максимальных снегозапасов уменьшились по новой методике в 1,5—2 раза [1]. Например, для северных и северо-западных районов ЕТС однородность рядов по максимальным снегозапасам не нарушена, т. е. не требуется введения поправок к снегозапасам, измеренным до 1966 г. [2].

Климатические характеристики (средние многолетние) по снежному покрову помещены в «Справочнике по климату СССР» [12]. Этими характеристиками следует пользоваться при климатологических обобщениях. Для совместного использования рядов снеговых наблюдений до и после введения новой методики целесообразно использовать вероятностный метод, который исключает необходимость приведения и увязки рядов наблюдений различной продолжительности. Для этого нужно построить номограмму для территории каждого УГМС по данным средних многолетних высот снежного покрова, помещенных в «Справочнике по климату СССР». Вероятностный метод позволяет использовать всю имеющуюся статистическую информацию о снежном покрове независимо от продолжительности снегомерных наблюдений.

Полученные результаты представляют практический и методический интерес в связи с рациональным использованием снежного покрова как важного природного фактора и оптимизацией системы снегомерных наблюдений на гидрометеорологической сети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вершинина Л. К. Оценка точности определения запасов воды в снежном покрове на площади.— *Тр. ГГИ*, 1969, вып. 178, с. 123—154.
2. Вершинина Л. К. К вопросу об увязке рядов наблюдений по снегомерным съемкам.— *Тр. ГГИ*, 1974, вып. 214, с. 30—36.
3. Дроздов О. А. О принципах рационализации сети метеорологических станций.— *Тр. ГГО*, 1961, вып. 123, с. 33—47.
4. Коган Р. М. и др. Определение влагозапасов в снежном покрове методом самолетной гамма-съемки.— *«Метеорология и гидрология»*, 1965, № 4, с. 27—34.
5. Кондратьев К. Я. Спутниковая климатология.— В кн.: Труды V Всесоюзного метеорологического съезда. Т. 3. Л., Гидрометеиздат, 1972, с. 107—123.
6. Копанев И. Д. Методы изучения снежного покрова. Л., Гидрометеиздат, 1971. 227 с.
7. Кравцова В. И., Лабутина И. А. Использование космических снимков для гляциологического изучения горных районов. В кн.: Исследование природной среды космическими средствами. Т. 3. М., Изд-во АН СССР, 1974, с. 57—68.
8. Кузьмин П. П. Формирование снежного покрова и методы определения снегозапасов. Л., Гидрометеиздат, 1960. 167 с.

9. Лебедев А. Н. Современные методы исследования климатов земного шара. В кн.: Труды V Всесоюзного метеорологического съезда. Т. 3. Л., Гидрометеоздат, 1972, с. 94—107.

10. Митропольский А. К. Техника статистических вычислений. М. «Наука», 1971. 576 с.

11. Рождественский А. В., Чеботарев А. И. Статистические методы в гидрологии. Л., Гидрометеоздат, 1974. 423 с.

12. Справочник по климату СССР. Ч. IV, вып. 1—10, 12, 13, 17, 18, 20, 29. Л., Гидрометеоздат, 1967—1968.

*А. Н. ЛЕБЕДЕВ, А. С. ЕГОРОВА, А. Д. ЛОЖКОМОНОВА,
Т. А. ПУСАН, А. А. ФАН*

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПАСНЫХ И ОСОБО ОПАСНЫХ ПОЛУСУТОЧНЫХ И СУТОЧНЫХ СУММ ОСАДКОВ

В каждом уголке земного шара население привыкло к определенному метеорологическому режиму. Применительно к нему сложился весь уклад его жизни. Любые значительные отклонения обычного режима погоды воспринимаются уже как необычные явления, которые по своему характеру всюду весьма различны. Так, в конце января 1974 г. газеты сообщали о сильных снегопадах и морозах во всех странах Восточного Средиземноморья, как о необычайном явлении для этих субтропических районов северного полушария. Указывалось, что такие явления местами здесь наблюдались впервые или не отмечались уже в течение многих десятилетий. Вместе с тем такие погодные ситуации во многих странах умеренной зоны представляют собой обычное зимнее явление. Значит, все определяется географией климатов.

Научный и практический смысл особых явлений погоды состоит только в том, что они наблюдались, но и в том, какой урон приносили они народам, населяющим эти районы, какие нарушения вызвали в обычном ритме их производственной деятельности. Последствия определяются интенсивностью и продолжительностью существования явлений и степенью их агрессивности.

Испокон веков человечество испытывает значительное влияние обычных метеорологических условий. Они проявляются в виде сильных продолжительных морозов, сильных продолжительных снегодов, высоких температур в условиях засушливой погоды и длительного бездождия, сильных продолжительных ливней и т. д. В частности, катастрофический продолжительный дождь наблюдался 12—13 сентября 1966 г. в Ленкорани, где за 23 ч 31 мин выпало 441 мм осадков; это больше, чем две месячные нормы. Уточненный максимум осадков 400 мм вообще представляет собой редкое явление не только в субтропиках СССР, но и во влажных

тропических и экваториальных районах мира. Конечно, этот максимум еще далек от мировых рекордов.

Для сравнения напомним, что в самом дождливом месте мира (Черапунджи) суточный максимум составляет 974 мм, в Банг (Филиппины) — 1168 мм, а на о. Реюньон — 1970 мм. В климатических условиях СССР суточные максимумы осадков на порядок меньше этих значений, но они тоже считаются весьма редким явлением.

В связи с исключительным разнообразием климата нельзя выбрать единого критерия опасности явления ни по одному элементу. Это относится и к территории СССР, где наряду с географическими особенностями большое значение имеет сезонный и метеорологических процессов. Между тем в методических пособиях по сбору данных об опасных и особо опасных явлениях погоды эти климатические закономерности учитываются очень слабо. Значит сами критерии опасности явления, рекомендованные в методических пособиях, в научном отношении недостаточно обоснованы и поэтому не могут служить характерными показателями для выявления пространственно-временных закономерностей каких-либо опасных метеорологических условий.

Исходя из опыта изучения климатов СССР и зарубежных стран нам представляется, что исследование опасных и особо опасных явлений должно идти по линии выявления взаимосвязи между различными метеорологическими элементами и явлениями, поскольку ни одно из них не может существовать изолированно. Известно, что многие опасные и особо опасные явления связаны с параметрами осадков или с большими скоростями ветра, или с исключительно низкими или исключительно высокими температурами воздуха в данной местности. Если каждый из этих элементов взять в качестве главного (лидирующего) показателя, то автоматически получим три вида комплексов опасных и особо опасных явлений: комплекс по атмосферным осадкам, ветровой и температурный. Комплекс будет полным, если в каждый из них включить характеристики по другим элементам и явлениям, которые сопутствуют основному (лидирующему) элементу.

Этой идеей мы и руководствовались при рассмотрении опасных и особо опасных осадков в северо-западных районах Европейской территории СССР, взяв в качестве лидирующего показателя — полусуточные и суточные суммы. Но здесь пока рассматривают лишь одни характеристики осадков вне взаимосвязи с другими показателями климата.

Исходными материалами для исследования послужили ежедневные данные наблюдений метеорологических станций Невская, Гдов, Западная Двина, Рославль, Смоленск, Окуловка, Сортавала, Перозаводск, Пудож, Ругозеро, Лоухи, Мыс Миккулкин, Архангельск, Тотьма и Петрунь (15 станций) за период 1936—1973 гг. Они обработаны по методу, предложенному в секторе климатографии ГГО [1—4], в ГМО Северо-Западного и Северного УГМ А. Д. Ложкомоевой, Т. А. Пусан и А. С. Егоровой.

Расчеты произведены по полной выборке. Это значит, что были тены все полусуточные и суточные суммы осадков по месяцам за год за весь обработанный период наблюдений. Примером гут служить табл. 1—3, в которых приведена вероятность числа учаев с суммами осадков по градациям за каждый месяц и год даны годовые их повторяемость ($P\%$) и обеспеченность ($R\%$).

Таблица 1

Вероятность числа случаев с суммами осадков за день по градациям.
Невская, 1936—1973 гг.

сая	0,1— 1,0	1,1— 2,0	2,1— 5,0	5,1— 10,0	10,1— 20,0	20,1— 30,0	30,1— 40,0	40,1— 50,0	50,1— 60,0	60,1— 80,0	Сумма
I	373	73	71	10	3						530
II	321	71	50	12							454
III	214	53	45	12	3						327
IV	161	57	69	26	6						319
V	123	44	65	42	9						283
VI	136	40	87	34	18	6					321
VII	131	56	85	46	31	10	4				363
VIII	127	55	98	51	23	2	1				357
IX	164	66	99	57	7						393
X	193	85	90	26	15						409
XI	285	61	87	24	4						461
XII	350	87	81	19	1						538
Год	2578	748	927	359	120	18	6				4755
$P\%$	54,2	15,7	19,5	7,6	2,5	0,4	0,1				
$R\%$	100,0	45,8	30,1	10,6	3,0	0,5	0,1				

Как видно из табл. 1—2, в течение 38 лет днем осадки на Невская отмечались 4755 раз, а ночью — 4401 раз. Превышение вторяемости дневных осадков над ночными незначительное. суточном цикле осадки выпадали 6617 раз. Значит, некоторые учаи выпадения осадков фиксировались в ночные и дневные сы. Но самое интересное, что из всех случаев рассматриваемого ления на долю суточных сумм осадков ≥ 20 мм приходится лишь $\frac{1}{6}$ и то преимущественно за счет летних дождей.

В зимнюю половину года (с ноября по март) на осадки с сучными суммами менее 10 мм приходится 99%, на осадки с сумми менее 5 мм—около 88% и на осадки с суммами менее 2 мм—оло 60%. Причем по частоте выпадения небольшие осадки являся господствующими. В то же время видно, что в летние месяцы оисходит заметное увеличение числа случаев с суточными сум-

Вероятность числа случаев с суммами осадков за ночь по градациям.
Невская, 1936—1973 гг.

Месяц	0,1— 1,0	1,1— 2,0	2,1— 5,0	5,1— 10,0	10,1— 20,0	20,1— 30,0	30,1— 40,0	40,1— 50,0	50,1— 60,0	60,1— 80,0	Сум
I	345	77	58	13	3						4
II	277	63	68	13							4
III	235	50	43	11	2						3
IV	178	47	65	23	4						3
V	123	42	43	30	5	2					2
VI	107	44	63	27	13	1					2
VII	116	54	66	40	19	2	3				30
VIII	118	49	47	49	27	5	1	1	1		28
IX	170	71	73	44	9	3					37
X	204	75	92	32	15	1					41
XI	248	74	88	29	3						44
XII	308	97	76	15	1						49
Год	2429	743	782	326	101	14	4	1	1		440
<i>П</i> %	55,2	16,9	17,8	7,4	2,3	0,3	0,1	0,02	0,02		
<i>Р</i> %	100,0	44,8	27,9	10,1	2,7	0,44	0,14	0,04	0,02		

мами осадков более крупных градаций. Однако вероятность появления суточных сумм осадков более 50 мм остается очень незначительной: один случай из 6617, что составляет 0,015%. Даже на случай с суммами более 30 мм приходится только около 0,25%. Значит, для Ленинграда и его окрестностей суточные суммы более 30 мм маловероятны и в исключительно редких случаях возможны суммы более 50 мм.

В зимние, ранние весенние и поздние осенние месяцы суточные суммы осадков редко превышают 2 мм, очень редко 5 мм и еще реже 10 мм. Суточные суммы более 20 мм практически не встречаются. За 38 лет на ст. Невская было только 5 случаев с суточными суммами в пределах 20—30 мм, что составляет 0,12% 4230 случаев. Даже на долю всех случаев с суточными суммами более 10 мм приходится только 2%.

Анализ полученных данных показывает, что характеристики, входящие в понятие особо опасных явлений, в Ленинграде и его окрестностях бывают исключительно редко. Каждый из этих случаев можно подробно исследовать по аэросиноптическим материалам. Вместе с тем можно и по этим данным заключить, что критерии особо опасных явлений по полусуточным суммам ≥ 50 мм летом и ≥ 20 мм зимой для климатических закономерностей Ленинград

ют определенное обоснование. Фактически народное хозяйство юга и области значительно чаще встречается со сложными метеорологическими условиями, вызываемыми осадками, чем это вытекает из формальных критериев опасности.

Результаты расчетов по остальным рассматриваемым станциям также приводят к такому выводу. Не загружая текст статистическими выводами, можно ограничиться приведением некоторых примеров.

Таблица 3

Вероятность числа случаев с суммами осадков за сутки по градациям.
Невская, 1936—1973 гг.

	0,1— 1,0	1,1— 2,0	2,1— 5,0	5,1— 10,0	10,1— 20,0	20,1— 30,0	30,1— 40,0	40,1— 50,0	50,1— 60,0	60,1— 80,0	Сумма
1	410	134	129	28	8	1					710
1	333	93	131	31	4						595
1	290	77	97	25	7	1					497
7	206	74	122	50	18						470
7	173	59	86	71	23	3					415
1	161	59	111	58	40	8	1				438
1	147	72	125	75	60	16	6	1			502
1	146	70	114	86	59	11	3	1		1	491
1	189	93	118	100	37	3	1				541
1	228	90	158	74	37	2					589
1	301	97	162	62	11	1					634
1	403	125	151	43	13						735
1	2987	1046	1504	703	317	46	11	2		1	6617
%	45,1	15,8	22,7	11,6	4,8	0,7	0,2	0,03		0,02	
%	100,0	9,54	39,1	16,4	5,8	0,95	0,25	0,05		0,02	

Как и на ст. Невская, по одному случаю с суточными суммами осадков более 50 мм было отмечено на станциях Тотьма, Архангельск, Лоухи, Ругозеро и Пудож и по два случая — на станциях Южная Двина и Окуловка. В течение обработанного периода наблюдений не было зарегистрировано ни одного случая с суточными суммами осадков более 50 мм на станциях Сортавала, Петаводск, Петрунь и на Мысе Микулкин. Из 14 станций 13 дали вполне сходные результаты по географическому распределению вероятностей особо опасных осадков в северных и северо-западных районах Европейской территории СССР. Лишь в Смоленске, которая лежит южнее северо-западных районов, суточные суммы осадков ≥ 50 мм отмечались 6 раз. Все они приходились на летние месяцы, из них три случая — на август.

Смоленск находится не только южнее рассматриваемых станций, но и лежит на западной окраине Смоленской возвышенности. Очевидно, эти два фактора — широтный и орографический — в известной мере способствовали сравнительно более частому выпадению особо опасных дождей. Тем не менее общие закономерности

Рис. 1. Вероятность (%) числа случаев с полусуточными и суточными суммами осадков по градациям. Архангельск.

1) сумма 0,1—1,0 мм; 2) 1,1—2,0 мм; 3) 2,1—5,0 мм; 4) 5,1—10,0 мм; 5) 10,1—20,0 мм; 6) >20,0 мм.

распределения осадков по градациям здесь такие же, как и в районе Ленинграда. На долю осадков с суточными суммами более 20—25 мм приходится тоже около 1%, а на долю осадков с суммами менее 2 мм — около 60%.

Распределение полусуточных сумм осадков, как показывают данные, подчиняется тому же закону, что и распределение суточных сумм. Нет существенных различий и между ночными и дневными

и суммами осадков. Единственное различие состоит лишь в том, дневные осадки бывают чаще, чем ночные. Этот вывод получен данным повторяемости выпадения осадков по многим пунктам людений.

На рис. 1—4 приведены вероятности числа случаев с полусуточными и суточными суммами осадков для станций Смоленск, Оку-

рис. 2. Вероятность числа случаев с полусуточными и суточными суммами осадков в различных пределах. Петрозаводск.

Усл. обозн. см. рис. 1.

ровка, Петрозаводск и Архангельск. Они вычислены из расчета общего числа случаев с осадками за день (7—19 ч), ночь (19—7 ч) сутки за весь обработанный период наблюдений. Общее число случаев с осадками по месяцам варьирует от 250—300 летом до 50—700 зимой. Эти числа случаев с осадками в каждом месяце принимались за 100%. По числу случаев с осадками в той

или иной градации определялась и их процентная по-
ряемость.

Анализируя графики, нетрудно видеть, что в холодную по-
вину года полусуточные и суточные суммы твердых осадков ли-
шь в исключительных случаях превышают 20 мм. По данным Арх

Рис. 3. Вероятность числа случаев с полусуточными и суточными сумм
осадков в различных пределах. Смоленск.

Усл. обозн. см. рис. 1.

гельска, такие обильные твердые осадки вообще отсутствуют. Мы
полагаем, что они не бывают и в северо-восточных районах Евро-
пейской территории СССР. В редкие годы они появляются здесь
лишь в мае, но более обычны с июля по август, когда все осадки
выпадают только в виде дождя.

Летом вероятность крупных осадков возрастает, что заметно
в сдвиге всех кривых годового хода. Если зимой на суточные

полусуточные суммы осадков менее 1 мм приходится до 65—75% случаев и более, то летом — только 30—40%. Зато летом чаще падают осадки более 30 мм, а в отдельных случаях и более мм. Один раз в 30—40 лет полусуточные и суточные суммы осадками достигают 60—65 мм, имеются примеры даже с осадками и 95 мм.

Рис. 4. Вероятность числа случаев с полусуточными и суточными суммами осадков в различных пределах. Окуловка.

Усл. обозн. см. рис. 1.

Хотя данные, приведенные на рисунках, относятся к пунктам, сравнительно далеко отстоящим друг от друга, тем не менее годовой ход осадков по принятым градациям имеет согласованный характер. Это позволяет заключить, что исследование опасных и особо опасных полусуточных и суточных сумм осадков может быть ограничено выборочной сетью станций. Сплошная обработка данных по всем имеющимся станциям вряд ли приведет к каким-

Вероятность суточных сумм осадков (мм)

Станция	Максимум, мм	Обеспеченность, %										Один раз в				
		1	2	5	10	20	50	год	5	10	20	30	40	50		
		Январь														
Рославль	17,9	19	8	6	5	3	1	6	10	11	14	16	18	21		
Смоленск	26,0	9	7	5	4	2	1	5	8	10	13	16	26	32		
Западная Двина	17,3	11	9	7	5	3	1	7	11	13	15	17	18	19		
Гдов	15,6	11	9	6	4	2	1	6	10	12	14	15	16	16		
Окуловка	21,2	9	7	5	4	3	1	6	9	11	16	19	22	23		
Невская	20,4	10	8	5	4	2	1	5	10	13	16	19	20	22		
Сортавала	15,8	10	8	6	4	3	1	6	10	12	14	16	16	17		
Пудож	14,0	9	8	6	4	3	1	6	9	10	12	12	14	15		
Петрозаводск	16,7	10	8	5	4	2	1	5	10	12	16	17	18	19		
Ругозеро	12,2	9	7	5	3	2	1	4	8	10	12	12	12	12		
Лоухи	17,5	9	7	5	4	2	1	5	9	11	14	16	16	18		
Мыс Микулкин	42,0	7	5	3	2	1	1	3	7	9	14	—	—	—		
Архангельск	15,4	8	6	4	2	2	1	4	8	10	13	15	16	17		
Петрунь	8,5	6	5	4	2	2	1	3	6	7	8	8	9	9		
Тотьма	11,1	7	6	5	4	3	1	5	7	8	9	10	10	11		
		Апрель														
Рославль	28,7	17	14	10	8	5	2	9	15	18	23	28	30	32		
Смоленск	26,0	16	13	10	7	4	2	8	14	18	22	26	29	33		
Западная Двина	31,0	17	14	10	7	5	2	8	16	19	24	28	31	35		

Невская	17,6	14	12	9	7	4	1	8	13	14	17	18	18	19
Сортавала	17,4	13	12	9	6	4	2	7	12	14	16	18	18	19
Пудож	18,6	12	11	8	6	5	2	7	11	13	16	17	19	20
Петрозаводск	20,5	18	14	9	7	4	2	8	16	19	20	21	22	22
Ругозеро	22,1	15	12	8	5	3	1	6	13	16	21	22	24	25
Лоухи	18,9	11	9	7	5	3	1	6	10	12	16	18	19	20
Мыс Микулкин	36,3	9	6	4	3	2	1	3	7	10	14	36	37	40
Архангельск	21,0	12	9	6	5	3	1	5	10	13	16	18	20	22
Петрунь	9,9	7	6	4	3	2	1	4	7	8	9	10	10	11
Тотьма	18,9	14	12	9	7	5	2	1	13	15	17	18	19	20

Июль

Рославль	65,2	40	30	19	14	9	2	17	35	46	59	66	70	74
Смоленск	63,5	30	25	18	14	9	3	16	27	34	49	58	64	68
Западная Двина	61,6	37	29	20	14	9	3	18	34	44	54	59	64	67
Гдов	40,7	31	26	17	12	8	2	14	28	34	39	41	42	43
Окуловка	59,0	37	29	19	13	9	2	17	34	43	51	55	59	60
Невская	40,9	31	26	19	14	9	3	16	28	29	38	40	42	43
Сортавала	48,6	27	23	17	12	8	3	13	25	28	37	50	51	53
Пудож	94,7	31	26	19	13	8	2	15	28	33	40	44	60	95
Петрозаводск	45,5	35	30	20	14	9	3	17	32	38	41	45	47	48
Ругозеро	37,4	29	23	16	11	7	1	14	25	31	35	37	38	39
Лоухи	47,1	31	25	17	13	8	3	15	27	34	41	45	48	50
Мыс Микулкин	48,6	23	18	13	9	5	2	9	19	24	31	49	50	52

Станция	Максимум, мм	Обеспеченность, %										Один раз в				
		1	2	5	10	20	50	год	5	10	20	30	40	50		
Архангельск	72,3	32	26	19	14	9	3	15	28	33	38	40	44	72		
Петрунь	37,7	22	18	14	10	7	2	11	20	23	27	29	31	38		
Тотьма	47,5	32	26	19	14	9	3	16	29	35	43	46	48	50		
О к т я б р ь																
Рославль	33,0	21	17	12	9	5	2	12	19	24	30	34	35	38		
Смоленск	44,0	20	16	11	8	5	2	10	18	23	31	38	44	47		
Западная Двина	35,3	16	14	11	9	6	2	10	15	17	21	24	32	42		
Гдов	25,8	19	16	11	8	5	2	10	18	21	24	26	27	28		
Окуловка	32,1	18	15	11	9	6	2	11	19	22	26	30	33	35		
Невская	26,6	16	14	10	8	5	2	10	16	19	22	26	29	30		
Сортавала	30,5	20	18	14	10	6	2	13	20	23	27	30	33	33		
Пудож	29,6	20	16	12	10	6	2	12	19	22	25	27	30	31		
Петрозаводск	26,0	19	16	12	8	5	2	11	18	21	25	27	28	29		
Ручьозеро	25,2	16	14	9	7	4	1	9	16	19	23	25	25	26		

Архангельск	24,4	14	11	8	6	4	1	8	14	18	21	24	26	26
Петрунь	17,0	12	10	8	6	3	1	8	12	14	15	16	17	18
Тотьма	32,7	17	14	10	8	5	2	10	16	20	25	29	31	35
					Год									
Рославль	65,2	23	18	12	8	5	1	27	42	50	62	71	75	80
Смоленск	63,5	24	19	12	8	4	1	60	46	54	60	64	67	69
Западная Двина	61,6	22	18	12	8	5	2	27	40	47	58	60	66	68
Гдов	47,5	21	16	10	7	4	1	25	35	39	44	48	50	51
Окуловка	59,0	22	18	12	8	5	1	28	40	46	55	56	59	61
Невская	62,1	20	16	11	8	5	1	24	34	39	46	52	59	63
Сортавана	48,6	19	15	11	8	5	2	22	35	46	50	51	53	53
Пудож	94,7	20	17	12	8	5	1	25	34	38	42	45	50	95
Петрозаводск	46,6	23	18	12	8	5	1	25	39	42	45	47	47	48
Ругозеро	50,7	20	16	10	7	4	1	23	31	35	38	41	42	53
Лоухи	59,6	21	18	11	7	3	1	25	34	39	43	45	50	60

нибудь существенным изменениям в результатах таких расчетов. Если Смоленск, Петрозаводск, Архангельск и Окуловка характеризуются однотипным распределением всех возможных полусуточных и суточных характеристик, то вряд ли можно ожидать, что эта закономерность будет нарушена данными наблюдений других метеорологических станций исследуемого района. Нам представляется, что излишнее уплотнение сети станций ничего нового не даст. В этом легко убедиться и по данным наблюдений станций Сорвала, Тотьма и других (табл. 4).

Что касается некоторых деталей распределения осадков по градациям на приведенных рисунках, то на них нет необходимости останавливаться. Читатель сам может свободно в них разобраться. Некоторые нарушения в ходе кривых не имеют принципиального характера. В частности, это относится к некоторым резким изломам кривых годового хода, но это объясняется не климатическими закономерностями, а скорее качеством наблюдений и недостаточным объемом выборок.

Для получения более ясного представления о количественных характеристиках суточных сумм осадков были вычислены их обеспеченности (1, 2, 5, 10, 20, 30, 40 и 50%) и вероятности сумм встречающихся один раз в год, один раз в 5, 10, 20, 30, 40 и 50 лет. Расчеты выполнены для всех месяцев и года. Здесь же приведены лишь данные для января, апреля, июля, октября и года (табл. 4).

Анализ полученных результатов показывает, что в распределении суточных сумм осадков по градациям обеспеченностей 1, 2, 10, 20, 30, 40 и 50%, а также по вероятностям осуществления значений, наблюдающихся один раз в год, один раз в течение 5, 20, 30, 40 и 50 лет, существует достаточно строгая закономерность. Она находится в тесной зависимости от термического режима северо-западных районов, широты и орографии местности. Ни одна из 15 станций, вошедших в расчеты, не привела к каким-либо необъяснимым результатам. Все они подчинены известным условиям климата и циркуляционным особенностям. В первую очередь нам хотелось бы отметить, что в течение всего года преобладают мелкие осадки — они создают общий фон дождливости. Зимой в 50% всех случаев, суточные суммы осадков составляют менее 0,8—1,4 мм, а летом — менее 2—3 мм. Эта особенность почти одинаково характерна для всех северных и северо-западных районов Европейской территории СССР.

Получается исключительно большая асимметрия в распределении числа случаев с осадками по градациям. В холодный период года половина всех суточных сумм осадков лежит в пределах от 0 до 1 мм, а в теплый период колеблется от 0 до 2—3 мм. Таким образом, общий вес мелких осадков по частоте их выпадения во все сезоны остается без существенных изменений и в то же время суточные суммы осадков по восходящей ветви кривой достигают 20—40 мм зимой и 60—90 мм летом.

Почти из 10 000 рассмотренных месяцев ни в одном из них

ни на одной из рассматриваемых станций не было случая с суточной суммой осадков 100 мм и более. Лишь в Пудоже в один июльских дней было зарегистрировано 94,7 мм (14 июля 65 г.), и больше нигде не встретилась близкая к ней сумма адков. Другой, сравнительно большой суточный максимум (2,3 мм), наблюдался в Архангельске. Очевидно, эти максимумы или обусловлены прохождением фронта. Местоположением этих анций они не объяснимы. Такие суточные максимальные значения были бы более характерны для районов Рославля, Смолена и Западной Двины. Однако там они не превышают 62—65 мм. Все остальные суточные максимумы, которые отмечались в период 1936—1973 гг., заметно меньше 60 мм в теплое полугодие и меньше 20 мм в холодное полугодие.

Хорошая согласованность между данными по градациям обеспеченностей и данными, наблюдающимися один раз в течение определенного периода лет, позволяет заключить, что по ним нетрудно выбрать показатели опасных и особо опасных полусуточных суточных сумм осадков. Они могут быть выбраны в зависимости от закономерностей климата или от потребностей самой практики. Показатели первого типа будут изменяться в связи с распределением осадков по территории, а показатели второго типа — в связи с задачами обеспечения запросов народного хозяйства; последние могут оставаться постоянными на территории больших физико-географических районов страны.

По данным обеспеченностей, критериями опасности полусуточных и суточных сумм осадков могут служить параметры сумм осадков 1, 2 и 5%. Это значит, что из каждой тысячи случаев 10, 20 или 50 случаев будут иметь суммы, входящие в понятие опасности явления. Для января при 1%-ной обеспеченности опасными суточными суммами осадков на юге северо-западных районов будут характеристики ≥ 10 мм, а на севере ≥ 6 мм. Эти критерии находят полное подтверждение в распределении характеристик, встречающихся один раз в 5 лет. Особо опасные явления, очевидно, нежат около максимумов из периода 30—40 лет, а в обеспеченностях должны лежать в пределах менее 0,5%. В числовых показателях это будут суточные суммы осадков ≥ 20 мм в южных районах территории и ≥ 10 мм в северных.

Летом критерии опасных явлений на юге исследуемой территории определяются суммами осадков ≥ 30 мм, а на севере — суммами ≥ 20 мм. Они находят свое подтверждение в сумме осадков 1%-ной обеспеченности и вероятности явлений, встречающихся один раз в 5 лет. Особо опасными явлениями будут суточные суммы осадков, наблюдающихся один раз в 30—40 лет; в южных районах за их числовые показатели можно принять ≥ 50 мм а в северных районах ≥ 40 мм.

Весной и осенью (апрель и октябрь) суточные суммы, отмечающиеся один раз в 30—40 лет, на юге территории (Рославль, Западная Двина, Окуловка) составляют около 30 мм, а на севере (Пудож, Петрозаводск, Архангельск) — около 20 мм.

Если степень опасности явлений определять однозначным критерием для всей территории, например величиной ≥ 50 мм, то многих районах особо опасных явлений, связанных с полусуточными и суточными осадками, не будет вообще. При обобщении материалов в общеклиматологическом плане такие районы следует выделить особо.

Как видно из анализа данных, примененный метод обработки позволяет обоснованно определить критерии опасности явления не только по физико-географическим условиям, в зависимости от сезонного хода элемента, но и по условиям требований современной социалистической практики.

Выводы

1. Метод номограмм дает прочную основу для исследования опасных и особо опасных метеорологических явлений, так как в их фундаменте легко выявляются специфические особенности распределения любого элемента. С помощью этого метода дается четкая структура частоты появления полусуточных и суточных сумм осадков по месяцам, сезонам и за год, а также по исследуемой территории. Географичность климата очевидна в распределении критериев опасности по сезонам и районам.

2. Степень опасности явлений может определяться различными критериями по своей численной значимости. Все находится в зависимости от конкретных задач практики. Метод номограмм позволяет просто и с высокой надежностью отвечать на подобные вопросы. В частности, для крупных промышленных и административных центров страны в зимние месяцы критериями опасных явлений могут служить полусуточные и суточные суммы осадков (твердые начиная с 5—6 мм, а критериями особо опасных явлений — полусуточные суммы осадков начиная с 10—11 мм. При таких суммах осадков, выпавших менее чем за 12—24 ч, в крупных городах расстраивается нормальный ритм работы транспорта, нарушается нормальная жизнь во многих звеньях городского хозяйства.

3. Критерии опасности явлений однозначны и в зависимости от общих закономерностей климата и физико-географических условий. Известно, что эрозия почв и любые другие разрушительные действия осадков в значительной мере предопределяются характером подстилающей поверхности, ее физико-механическими свойствами.

4. Результаты расчетов показывают, что исследования опасных и особо опасных метеорологических явлений должны осуществляться с позиций общей климатологии, что позволит глубже понять закономерности погодных процессов, с которыми связаны эти явления.

5. По имеющимся данным, обработанным нами и содержащимся в климатическом справочнике, в северо-западных районах Европейской территории СССР возможный суточный максимум осадков

авляет около 120 мм. Наибольшим зарегистрированным максимум пока можно считать суточную сумму осадков на ст. Вере — 112 мм (12 июля 1953 г.).

б). Особенности распределения опасных и особо опасных полусуточных и суточных сумм осадков в равнинных районах Европейской территории СССР могут быть выявлены по наблюдениям 100 станций. Для климатологических целей нет необходимости «опасные явления по полусуточным суммам осадков по метеорологической сети. Достаточно воспользоваться выборочной сетью станций, имеющих периоды наблюдений более 30 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дунаева А. В. Выборочный метод как основа для правильной организации стационарных снегосъемок. — «Тр. ГГО», 1964, вып. 163, с. 122—155.
2. Климаты Африки. Под ред. А. Н. Лебедева и О. Г. Сорочан. Л., Гидроиздат, 1967. 488 с.
3. Логвинов К. Т., Бабиченко В. Н., Кулаковская М. Ю. Опасные явления погоды на Украине. Л., Гидрометеиздат, 1972. 236 с. (Тр. НИГМИ, вып. 110).
4. Лебедев А. Н. Современные методы исследования климатов земного шара. — «Тр. V Всесоюзного метеорологического съезда», Т. III. Л., Гидрометеиздат, 1972, с. 94—106.

О МЕТОДИКЕ ОБОБЩЕНИЯ ЕЖЕЧАСНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА

Век технического прогресса в области метеорологии характеризуется интенсивным развитием средств производства многочисленных наблюдений. Расширяется сеть метеорологических станций, учащаются сроки наблюдений, расширяется программа самих наблюдений. Все это ведет к интенсивному увеличению объема информации. Общий объем метеорологической информации быстро увеличивается и за счет многочисленных крупных, в том числе и международных гидрометеорологических экспедиций. При таких больших масштабах накопления информации вопросы методики обработки и обобщения имеющейся метеорологической информации приобретают особую актуальность. Это тем более важно, что в наше время почему-то ослабло внимание к вопросам самой методики обработки данных и к получению новых показателей качества.

Представляется целесообразным изложить некоторые соображения относительно обобщения ежечасных наблюдений за температурой воздуха. Эти соображения появились в результате исследований климатов различных частей мира. При работе над климатами зарубежных стран неоднократно возникала необходимость дать характеристику климата по разрозненным и неполным сведениям. В этом случае приходилось прибегать к поиску ежедневных данных наблюдений. При наличии даже кратковременных и подчас разрозненных наблюдений всегда удавалось получить больше сведений по климату, чем по средним данным за отдельные годы, если последние имелись и за более длительный период лет.

В настоящей статье обобщение, обработка и анализ ежедневных данных показаны на примере январских ежечасных наблюдений за температурой воздуха на ст. Кызыл (Тувинская АССР) период 1963—1972 гг. Таким образом, исходным материалом являются данные 7440 измерений, которые необходимо климатически осмыслить и выполнить нужные расчеты.

Эти данные распределены по градациям через 2°C, поскольку размах колебаний температуры очень велик. При меньших колебаниях распределение наблюдаемых значений можно (в некоторых случаях нужно) произвести по градациям через 1°C. Распределение наблюдаемых значений через 2°C произведено по часам (1, 2, ... 24 ч) и по дням месяца (1, 2, ... 31 день). Эти формы борки исходных данных в сокращенном виде приведены в табл. 1, где r — число случаев, ω — повторяемость по каждой градации отдельно (%), P — обеспеченность (суммирование повторяемостей температур по градациям от самых высоких до крайних низких значений) (%).

В табл. 1 в последней графе («Сумма») $r=310$ для каждого срока измерений. Эта цифра составляет сумму дней в январе за 10 лет. В табл. 2 в графе «Сумма» $r=240$. Эта цифра складывается из 24 сроков наблюдений за каждый день за 10 лет. В этой графе даны итоговые суммы повторяемостей и обеспеченностей, составляющие 100%.

Эти таблицы имеют не только вспомогательное значение для выборки исходных значений, но и для анализа результатов расчета по градациям. Последние дают возможность исследователю сделать первоначальный анализ закономерностей распределения температуры в рассматриваемом районе. В табл. 1—2 релье-

рис. 1. Интегральные кривые распределения температуры воздуха. Кызыл.
1 — 1 ч, 2 — 15 января.

но выступают крайние значения и их вероятности, четко проявляясь наиболее часто наблюдающиеся значения, которые предопределяют многолетний режим температуры и, наконец, по ходу распределения повторяемостей по градациям легко просматривается степень симметричности распределения исследуемого элемента. Данные табл. 1—2 являются основой для построения интегральных кривых температуры по срокам и по каждому дню. С них затем снимаются значения температуры 1, 5, 10, 20, ..., 90, 95 и 99%-ной обеспеченности. Одновременно по ним определяются максимальные и минимальные величины, а также средние значения по данной выборке. Таким образом, подготавливаются табл. 3—4, в которых даны температуры воздуха по 24 срокам и по каждому дню месяца отдельно различной обеспеченности. Здесь в качестве примера приведены интегральные кривые температуры воздуха для 01 ч и для января (рис. 1).

Выборка температуры воздуха по часам. Январь, Кызыл, 1963—1972 гг.

Часы	Пара-метр	Градации температуры, °С										Сумма
		-12,0; -13,9	-14,0; -15,8	-16,0; -17,9	-18,0; -19,9	-20,0; -21,9	-22,0; -23,9	...	-46,0; -47,9	-48,0; -49,9	-50,0; -51,9	
	<i>r</i>		1	4	4	15	7		2	3	4	310
I	<i>W</i>		0,4	1,4	1,4	4,9	2,4		0,6	0,9	1,4	100 %
	<i>P</i>		0,4	1,8	3,2	8,1	10,5		97,7	98,6	100	100 %
.....												
	<i>r</i>	1	—	3	6	15	8		4	2	4	310
24	<i>P</i>	0,3	—	0,9	1,9	4,8	2,6		1,4	0,6	1,3	100 %
	<i>W</i>	0,3	—	1,2	3,1	7,9	10,5		98,1	98,7		100 %
Общее число случаев		3	22	89	218	366	445		69	49	31	7440
Повторяемость по градациям		0,04	0,3	1,2	2,9	4,9	6,0		0,9	0,7	0,4	100 %

Выборка температуры воздуха по дням. Январь, Кызыл, 1963—1972 гг.

Дата	Пара-метры	Градации температуры, °С										Сумма	
		-16,0; -17,9	-18,0; -19,9	-20,0; -21,9	-22,0; -23,9	-24,0; -25,9	-26,0; -27,9	...	-46,0; -47,9	-48,0; -49,9	-50,0; -51,9		
	г		16	25	33	25			10	2			240
1	W		6,6	10,4	13,8	10,4			4,1	1,0			100 %
	P		6,6	17,0	30,8	41,2			99,0	100			100 %
.....													
	г	4	6	13	20	24	30		2	7			240
31	W	1,7	2,5	5,3	8,4	10,0	12,5		0,8	2,9			100 %
	P	1,7	4,2	9,5	17,9	27,9	40,4		93,8	86,7			100 %
Общее число случаев		88	217	361	449	618	785		69	47			7440
Повторяемость по градациям		1,2	2,9	4,8	6,0	8,3	10,6		0,9	0,6			100 %
Обеспеченность		1,6	4,5	9,3	15,3	23,6	34,2		98,9	99,5			100 %

Температура воздуха (°С) в различн

Часы	Средняя	Максимальная	Обеспече					
			1	5	10	20	30	40
1	-33,1	-14,2	-15,0	-19,8	-22,7	-26,0	-28,3	-31
2	-33,2	-14,0	-15,6	-19,4	-22,0	-22,5	-27,8	-30
3	-33,3	-15,2	-16,4	-19,9	-21,9	-26,0	-28,4	-30
4	-33,3	-16,4	-17,2	-20,2	-22,7	-25,6	-28,0	-30
5	-33,3	-16,1	-17,3	-20,1	-22,7	-25,6	-28,0	-30
6	-33,0	-17,7	-18,2	-20,4	-22,7	-25,7	-27,9	-30
7	-31,9	-17,3	-17,6	-19,8	-22,1	-24,8	-26,6	-28
8	-30,8	-16,6	-17,3	-19,5	-21,4	-23,7	-25,8	-27
9	-29,7	-15,6	-16,6	-18,1	-20,3	-22,4	-25,0	-26
10	-28,7	-16,8	-16,9	-17,8	-18,9	-22,2	-23,8	-25
11	-27,6	-16,2	-16,3	-17,3	-19,3	-21,5	-23,3	-25
12	-27,6	-15,3	-15,4	-17,2	-18,7	-21,1	-23,2	-24
13	-28,2	-14,9	-16,2	-18,2	-19,6	-22,3	-23,8	-25
14	-29,2	-14,3	-17,2	-18,9	-20,4	-22,6	-24,5	-25
15	-30,7	-14,7	-17,2	-19,6	-21,2	-23,7	-25,6	-26
16	-30,8	-14,9	-17,2	-19,9	-21,5	-24,3	-26,2	-28
17	-31,4	-14,2	-17,2	-20,0	-21,9	-24,5	-26,4	-27
18	-31,9	-9,1	-17,0	-19,9	-22,2	-25,2	-27,0	-29
19	-32,2	-10,3	-17,0	-20,2	-22,1	-25,5	-27,4	-29
20	-32,4	-11,2	-17,4	-20,2	-22,4	-25,6	-28,2	-30
21	-32,6	-11,6	-17,6	-20,2	-22,6	-25,4	-27,6	-30
22	-32,7	-13,1	-17,5	-20,1	-22,5	-26,0	-27,8	-30
23	-32,8	-12,8	-17,4	-20,2	-23,0	-25,5	-28,0	-30
24	-33,0	-13,6	-17,5	-20,4	-22,6	-25,7	-28,2	-30
Сумма	753,7	-346,1	-406,2	-467,3	-517,5	-583,4	-636,8	-682
Среднее	-31,4	-14,4	-16,9	-19,4	-21,5	-24,3	-26,5	-28

В табл. 3 приведены данные о температуре воздуха различной обеспеченности для каждого часа суток, одновременно указываются средние, максимальные и минимальные значения. Таким образом, можно получить исчерпывающую характеристику термического режима для каждого часа суток отдельно и для всех случаев в целом. По данным этой таблицы весьма четко в количественной форме прослеживается суточный ход температуры. Разность между наибольшим и наименьшим значениями минимальной температуры составляет 10°С, а максимальной температуры — 8,6°С. Если же

Таблица 3

сы суток. Январь, Кызыл, 1963—1972 гг.

Температура, %							Минимальная
50	60	70	80	90	95	99	
-33,0	-35,0	-36,9	-39,0	-41,0	-43,2	-49,0	-51,2
-32,4	-34,2	-36,2	-38,4	-41,5	-44,0	-48,0	-51,2
-32,3	-34,2	-36,2	-38,2	-41,3	-43,5	-47,0	-51,7
-32,1	-34,0	-36,1	-38,5	-41,7	-44,2	-48,2	-51,6
-32,0	-33,8	-35,9	-38,5	-41,7	-44,1	-48,0	-51,4
-31,9	-33,7	-35,6	-38,1	-41,1	-43,8	-48,2	-50,5
-30,7	-32,6	-34,8	-37,2	-40,2	-43,0	-46,4	-48,6
-29,4	-31,5	-33,6	-36,5	-39,3	-41,0	-46,2	-46,4
-28,6	-30,5	-32,5	-34,8	-37,6	-39,5	-42,4	-45,7
-27,6	-29,3	-31,5	-33,5	-36,1	-38,5	-41,4	-43,8
-26,8	-28,5	-30,6	-32,6	-35,3	-37,8	-40,0	-42,1
-26,2	-28,1	-30,0	-32,4	-35,4	-37,5	-39,4	-41,7
-26,7	-28,6	-30,3	-32,5	-36,0	-38,0	-41,0	-42,5
-27,3	-28,9	-31,2	-33,6	-37,0	-40,0	-43,1	-44,6
-28,3	-30,1	-31,9	-34,4	-37,5	-41,1	-45,8	-46,9
-29,6	-31,8	-34,1	-36,1	-39,0	-41,0	-46,0	-47,5
-30,1	-31,7	-33,5	-35,3	-38,9	-40,5	-42,6	-48,1
-30,9	-33,1	-34,7	-36,6	-39,7	-41,7	-46,4	-48,4
-31,5	-33,4	-35,0	-37,0	-40,3	-42,5	-47,4	-49,2
-31,6	-34,0	-35,5	-37,4	-40,5	-43,3	-48,0	-49,8
-32,0	-33,8	-35,6	-38,1	-40,9	-43,0	-48,0	-50,3
-32,1	-33,9	-35,6	-37,9	-39,9	-41,0	-48,0	-50,4
-31,7	-33,8	-35,6	-38,1	-40,9	-43,1	-47,4	-50,7
-32,4	-34,3	-36,3	-38,5	-41,0	-44,0	-47,4	-50,6
-727,2	-772,8	-819,2	-873,2	-943,8	-999,3	-1049,8	-1154,9
-30,3	-32,2	-34,1	-36,4	-39,3	-41,6	-45,6	-48,1

в таблице указать годы, на которые приходится соответствующие максимумы и минимумы, тогда каждый синоптик, климатолог или метеоролог в состоянии ответить потребителю, где, когда и в какое время суток было зафиксировано то или иное экстремальное значение температуры. Это то, чего не хватает не только в оперативном обслуживании, но и в кратких ответах и докладах руководящих работников службы.

В табл. 4 дана температура воздуха различной обеспеченности по каждому дню месяца за обработанный период наблюдений.

Температура воздуха (°C) в отдельн

Дни	Средняя	Максимальная	Обеспеч					
			1	5	10	20	30	40
1	-30,7	-20,6	-20,8	-21,0	-21,6	-23,2	-24,8	-26,2
2	-30,1	-20,0	-20,2	-21,0	-21,2	-23,0	-24,6	-26,5
3	-29,6	-16,6	-17,2	-18,5	-19,9	-22,0	-24,0	-25,8
4	-30,1	-15,6	-15,5	-17,0	-18,5	-20,3	-22,3	-24,7
5	-30,4	-17,9	-18,0	-19,0	-19,7	-22,1	-23,8	-26,7
6	-32,1	-17,3	-17,6	-18,8	-21,0	-24,6	-27,1	-29,0
7	-31,4	-17,3	-17,5	-18,5	-20,3	-23,5	-25,8	-28,1
8	-31,3	-13,0	-15,0	-16,1	-19,0	-24,1	-27,3	-28,9
9	-32,0	-18,2	-18,6	-20,4	-21,9	-24,4	-26,6	-28,6
10	-30,7	-20,2	-20,6	-21,3	-22,7	-24,8	-25,7	-26,6
11	-28,7	-16,8	-17,2	-19,5	-21,1	-23,0	-24,5	-26,0
12	-30,0	-16,1	-17,4	-19,6	-21,0	-24,3	-26,3	-27,6
13	-31,3	-19,6	-19,8	-21,0	-22,2	-24,5	-27,1	-29,2
14	-31,9	-18,1	-18,3	-19,2	-21,0	-25,0	-27,4	-29,6
15	-30,2	-13,1	-15,0	-17,3	-20,0	-23,4	-25,6	-27,6
16	-30,0	-9,1	-10,1	-17,0	-21,0	-24,0	-26,4	-28,2
17	-30,1	-17,6	-17,8	-18,5	-20,2	-23,8	-25,9	-27,6
18	-29,0	-17,2	-17,2	-17,8	-18,7	-22,1	-25,1	-27,0
19	-31,8	-14,0	-14,2	-15,7	-19,0	-25,1	-27,7	-30,0
20	-32,2	-16,8	-17,5	-20,8	-22,2	-24,3	-26,0	-27,6
21	-33,4	-18,8	-19,1	-21,5	-23,5	-25,5	-27,2	-29,2
22	-32,6	-15,5	-16,5	-19,6	-22,0	-25,6	-28,5	-31,3
23	-33,8	-16,9	-19,2	-19,8	-23,0	-28,2	-30,3	-32,0
24	-33,0	-16,7	-17,1	-21,4	-24,6	-27,7	-29,4	-30,9
25	-33,4	-17,2	-17,5	-22,0	-24,0	-26,4	-28,6	-31,0
26	-32,0	-14,6	-15,2	-20,3	-22,5	-24,6	-26,0	-27,4
27	-32,5	-21,6	-21,8	-22,5	-23,4	-25,8	-27,6	-29,5
28	-33,6	-19,0	-19,4	-22,0	-24,1	-27,0	-28,9	-30,7
29	-32,6	-19,0	-19,2	-21,0	-22,8	-24,6	-26,6	-28,6
30	-31,9	-17,4	-17,6	-19,0	-20,6	-23,2	-25,6	-27,2
31	-31,8	-16,8	-17,4	-19,2	-21,1	-23,4	-25,4	-27,0
Сумма	974,2	528,8	545,6	606,3	661,8	742,3	818,1	876,3
Среднее	31,4	17,0	17,6	19,6	21,3	23,9	26,4	28,3

Таблица 4

I. Январь, Кызыл, 1963—1972 гг.

гь, %							Минимальная
50	60	70	80	90	95	99	
27,6	-29,4	-32,2	-37,0	-42,9	-45,0	-47,0	-48,6
28,2	-30,4	-32,8	-35,7	-38,6	-40,2	-42,4	-44,2
27,6	-29,9	-33,2	-36,3	-39,6	-41,0	-42,5	-43,6
27,3	-31,6	-35,2	-38,7	-41,6	-43,1	-44,5	-45,3
28,3	-30,8	-34,0	-37,7	-41,8	-43,4	-44,6	-45,3
30,8	-32,7	-34,7	-38,0	-41,8	-43,0	-45,0	-45,8
30,1	-32,5	-35,3	-38,7	-41,8	-43,5	-45,6	-47,3
30,4	-32,1	-34,3	-36,7	-40,0	-41,6	-42,9	-44,3
30,5	-32,5	-34,1	-35,4	-37,7	-40,7	-42,8	-44,5
29,9	-32,3	-33,4	-35,4	-38,0	-39,4	-41,4	-42,5
27,6	-29,5	-31,1	-32,3	-33,5	-36,2	-41,2	-41,8
28,8	-30,4	-32,5	-34,3	-35,9	-37,3	-39,2	-39,7
31,3	-33,3	-34,4	-35,5	-36,6	-38,0	-39,6	-40,6
31,8	-33,6	-35,3	-36,6	-38,3	-39,8	-41,4	-43,8
29,5	-31,4	-33,4	-35,1	-36,9	-38,0	-38,2	-42,3
29,6	-30,7	-32,2	-35,0	-37,7	-39,0	-40,7	-42,0
29,2	-31,0	-33,0	-35,0	-37,8	-39,0	-40,5	-40,8
29,0	-30,6	-32,2	-33,7	-35,7	-37,4	-39,4	-41,1
31,5	-33,1	-34,5	-36,0	-40,3	-43,0	-45,0	-47,6
29,4	-32,3	-35,5	-38,5	-43,0	-45,6	-48,5	-49,7
31,4	-33,7	-36,3	-38,7	-42,1	-46,0	-48,2	-48,5
32,3	-34,0	-35,7	-37,5	-39,3	-40,6	-42,3	-44,8
33,5	-35,1	-36,6	-38,0	-39,7	-41,6	-45,0	-46,3
32,2	-33,4	-34,8	-37,0	-39,4	-40,8	-43,0	-44,8
32,9	-34,4	-36,2	-38,7	-40,8	-41,9	-43,0	-43,8
29,1	-31,5	-35,5	-39,7	-43,0	-45,0	-46,6	-50,3
31,1	-32,6	-34,2	-36,5	-41,0	-46,1	-49,4	-50,8
32,2	-33,4	-35,0	-37,0	-43,0	-48,0	-50,4	-52,1
30,6	-32,8	-35,2	-38,0	-41,0	-47,5	-47,9	-51,7
29,4	-33,0	-36,2	-38,6	-42,0	-47,0	-47,5	-50,8
28,9	-32,5	-36,6	-39,2	-42,2	-47,0	-50,4	-51,4
932,2	996,5	1065,6	440,5	1232,9	1305,7	1327,9	1416,1
30,1	32,1	34,3	36,7	39,7	42,1	44,3	45,7

**Суммарная продолжительность (ч) температур воздуха по двум
Январь, Кыз**

Срок, ч	Градация										
	-8,0; -9,9	-10,0; -11,9	-12,0; -13,9	-14,0; -15,9	-16,0; -17,9	-18,0; -19,9	-20,0; -21,9	-22,0; -23,9	-24,0; -25,9	-26,0; -27,9	-28,0; -29,9
4		2	1	2	5	20	37	43	58	80	62
8	0,3	0,3	0,3	3	9	23	37	42	62	76	76
24	0,1	0,3	0,3	2	9	22	37	44	62	78	78

Эти данные характеризуют термический режим каждого дня и во
го месяца в целом. Если же в таблице указать годы, на котор
приходятся соответствующие максимумы и минимумы, то тог
станет известно о днях наиболее высоких и наиболее низких те
ператур.

Вряд ли следует подробно останавливаться на практическ
и научной целесообразности подобной обработки данных. Их
могут заменить, тем более превзойти по содержанию, никакие дру
гие известные формы и способы представления данных. При тако
способе представления данных исследователю нетрудно выявить ил
установить закономерности в характере термического режим
Здесь все представлено точно и ясно, без искажения натуральн
данных.

Рис. 2. Номограмма для расчета ежечасных температур воздуха различной
обеспеченности. Январь, Кызыл.

Таблица 5

ным интервалам, вычисленных по данным за 4, 8 и 24 срока.
3—1972 гг.

температуры, °С											Сумма
0,0; -32,0; -33,9	-32,0; -33,9	-34,0; -35,9	-36,0; -37,9	-38,0; -39,9	-40,0; -41,9	-42,0; -43,9	-44,0; -45,9	-46,0; -47,9	-48,0; -49,9	-50,0; -51,9	
3	70	73	64	55	42	30	11	5	5	4	744
7	71	74	54	55	34	24	13	7	5	4	744
3	72	73	56	51	37	24	12	7	3	5	744

В конечном счете можно перейти к еще более сжатому виду представления — номограмме. На рис. 2 представлены в виде номограммы ежечасные данные о температуре воздуха. На вертикальной оси показаны средние ежечасные значения за 10 лет, по горизонтальной оси — фактические значения, которые встречались в граничные дни. Поле номограммы занято линиями обеспеченностей 1, 5, 10, 20, ... 90, 95 и 99%. Имея средние по срокам, по номограмме легко вычислить характеристики температуры различной обеспеченности. Опыт показывает, что при наличии номограммы и средних по срокам раскрывается вся структура рис. 3. Значит нет необходимости хранить всю информацию в виде временных таблиц. Достаточно знать средние по срокам и иметь номограмму, чтобы можно было вычислить любые вероятностные характеристики.

Таким образом, номографирование климатических данных может считаться одним из наиболее надежных методов обобщения больших объемов информации. При этом средние и вероятностные показатели элемента даются в непосредственной взаимосвязи. Эта взаимосвязь достаточно тесная, она проверялась на примере всех годовых элементов климата и всегда давала вполне положительные результаты.

По материалам ежедневных наблюдений нетрудно вычислить характеристики продолжительности температуры. Такие расчеты были сделаны нами для двухградусных интервалов, поскольку по таким градациям производилась выборка исходных данных для всех вариантов. В первом случае принимались во внимание лишь данные за 1, 7, 13 и 19 ч (четыре срока), во втором случае — данные за 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 ч (восемь сроков), а в третьем случае в расчетах использовались данные ежечасных наблюдений (4 срока). Результаты расчетов представлены в табл. 5.

Получилось идеальное согласование данных продолжительности температур по двухградусным интервалам, вычисленных по данным за 8 и 24 срока. Даже результаты расчетов по данным за срок удовлетворительно согласуются с данными за 8 и 24 срока. По ним можно заключить, что при расчете временных характеристик термического режима нет необходимости принимать

в расчет весь объем информации ежечасных наблюдений. Уменьшив объем информации в 3—4 раза, можно получить те же окончательные результаты.

Выводы

1. Предложены новые формы и способы обобщения ежедневных данных, которые раскрывают всю структуру термического режима.
2. Методика обеспечения и номографирования позволила существенно сжать большой объем текущей информации, не искажая истинной картины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Климаты Африки. Под ред. А. Н. Лебедева и О. Г. Сорочан. Л., Гидрометеоздат, 1967. 488 с.
2. Параметры тропического климата для технических целей. Под ред. А. Н. Лебедева и В. Н. Лашкова. Л., Гидрометеоздат, 1973. 515 с.
3. Лебедев А. Н. Временные характеристики температуры воздуха.— «Тр. ГГО», 1960, вып. 113, с. 71—84.
4. Лебедев А. Н. Графики и карты для расчета климатических характеристик различной обеспеченности на территории СССР. Л., Гидрометеоздат, 1960. 116 с.
5. Лебедев А. Н. Средние месячные температуры воздуха различной обеспеченности на Европейской территории СССР.— «Тр. ГГО», 1961, вып. с. 93—109.
6. Лебедев А. Н. Продолжительность дождей на территории СССР. Гидрометеоздат, 1964. 510 с.
7. Лебедев А. Н. Атлас карт и номограмм для расчета характеристик продолжительности осадков, периодов с дождями и без дождей на территории СССР. Л., Гидрометеоздат, 1964. 88 с.
8. Лебедев А. Н. Приложение метода номограмм к исследованию климатических закономерностей в тропических и экваториальных широтах.— «Тр. ГГО», 1965, вып. 182, с. 113—142.
9. Лебедев А. Н. Об изменчивости суммарной радиации в Африке.— «Тр. ГГО», 1966, вып. 192, с. 44—52.
10. Лебедев А. Н. Обеспеченность суточных величин суммарной радиации на островах Индонезии и океана.— «Тр. ГГО», 1969, вып. 247, с. 59—63.
11. Лебедев А. Н. Методы исследования климатов земного шара.— В кн. Метеорология и климатология. Т. 2. М., изд. ВИНТИ, 1974, с. 191—220.
12. Кадырова А. Г. и др. Закономерности температурно-влажностного режима тропической зоны.— «Тр. ГГО», 1972, вып. 284, с. 3—17.

А. Г. КАДЫРОВА

ОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МНР

Природные ресурсы МНР вообще и ее климат в частности интересуют исследователей уже давно. Исследованию растительности климата Монголии посвящены работы А. А. Каминского, К. Козлова, А. А. Юнатова, Е. П. Архиповой, А. Н. Лебедева и др. Однако круг прикладных задач постоянно расширяется и для решения необходимы более подробные сведения о климате. Сложный рельеф страны, сравнительно высокое положение ее над уровнем моря, защищенность от влияния морей и океанов создают специфические условия для формирования резко континентального климата. Последний характеризуется холодной, относительно малоснежной зимой и жарким сухим летом. В таких природных районах параметры атмосферных осадков приобретают особое значение.

Рис. 1. Розы ветров в дни с осадками (2) и в среднем за июль (1).

а — Далан-Дзадгад, б — Сайн-Шанд, в — Мандал-Гоби, г — Хонгор.

В предложенной статье наибольшее внимание уделено расчету продолжительности выпадения осадков и их интенсивности. Эти сведения представляют исключительный интерес для решения многих практических задач.

Режим осадков над Зарубежной Азией исследован в опубликованной монографии [1]. Известно, что на территории Монголии основные периоды года являются основными. С мая по октябрь выпадает 80—90% осадков от общей годовой суммы. Это преимущественно циклонические осадки фронтального происхождения, а также конвективные осадки, возникающие вследствие полуденного прогрева. Заметим, что вопросы циркуляции и осадкообразования

Рис. 2. Номограмма для расчета месячных сумм осадков за теплый период (май—октябрь).

Зарубежной Азией, особенно над ее пустынной частью, до настоящего времени изучены недостаточно и требуют дальнейших исследований.

На рис. 1 приведены розы ветров в дни с осадками и в среднем за июль, построенные для пустынных станций Монголии (Дал Дзадгад, Сайн-Шанд, Мандал-Гоби, Хонгор). Преобладающая повторяемость северных румбов свидетельствует о том, что осадки чаще всего выпадают при северных, северо-восточных и северо-западных ветрах.

Общая картина распределения осадков хорошо согласуется с физико-географическими районами, выделенными на территории Монголии А. А. Юнатовым [5]. С увеличением осадков с юга на север на смену скудному Гобийскому ландшафту приходят степи и далее, в горных районах Хангая и Хэнтея, богатое разнообразие лесов. Здесь выпадают самые большие годовые суммы осадков: 300—400 мм, а в отдельные годы до 550 мм. В степной зоне они уменьшаются до 240—280 мм и в Монгольской Гоби до 100 мм.

мм. В Заалтайской Гоби, особенно в замкнутых котловинах, вые суммы не превышают 50 мм. Это самые сухие места на итории МНР. Таким образом, влияние осадков на растительь четко проявляется как в широтной зональности, так и в верьной поясности. Перечисленные количественные критерии сятся к годовым многолетним нормам.

Месячные суммы осадков изменяются по территории аналогичодовым суммам. В самый дождливый месяц (июль) в предьях Хангая, на его северо-восточном склоне, выпадает в средоколо 100 мм осадков.

еверной части Гоби июльнормы уменьшаются в 3—аза, а в засушливые годы—25 раз.

На рис. 2 приведена номома месячных сумм осадза теплый период года. Наертикальной оси даны меме суммы осадков, осредные с мая по октябрь заголетний период. По гориали отложены возможныеичные суммы осадков приветствующих средних значениях за период. Нетрудноть, что при измененииних значений от 10 домм, которые наиболее харгерны для засушливыхажных районов Монголии,ожное количество осадковмесяца может изменяться) до 210 мм. С помощьююй номограммы можно по

ить не только месячную изменчивость данного элемента, но и оцеь с определенной точностью вероятность выпадения осадкове и ниже определенных пределов.

Суточное количество осадков в известной степени связано с ихичными и годовыми суммами. Однако на некоторые особенностипределаения этой характеристики следует обратить внимание.риимер, рекордное количество осадков за сутки отмечено неждливых районах страны, а в ее пустынной части. В Даландгаде 6 августа 1956 г. выпало 138 мм осадков за 23,5 ч приме 36 мм. Не всегда абсолютный суточный максимум прихося на самые дождливые месяцы (июль и август). На некоторыхациях он может наблюдаться в июне или октябре (Кобдо, Му, Улан-Батор, Сайн-Шанд и т. д.).

На рис. 3 дана интегральная кривая распределения экстремальсуточных сумм осадков. Выборка последних производилась за

Рис. 3. Интегральная кривая распределения экстремальных значений суточных сумм осадков за теплый период (май—октябрь).

месяцы теплого периода из 20—25-летнего ряда наблюдений. данным графика можно заключить, что вероятности экстремных осадков за сутки больше 30 мм и меньше 30 мм одинаковы и составляют 50%. Значения суточного максимума более 10 встречаются с обеспеченностью 95%, т. е. практически каждый а больше 60 мм — всего лишь с обеспеченностью 5%. В эти же вошел абсолютный суточный максимум — 138 мм, о котором миналось выше. Нижний предел интегральной кривой свидетельствует о наличии с мая по октябрь суточных максимумов, близких к нулю.

Таблица 1

**Средняя продолжительность осадков
в день с осадками (часы)**

Станция	I	IV	VII	X
Монгольская Народная Республика				
Мурэн	6,6	4,6	4,6	4,9
Кобдо	6,9	5,9	3,3	6,6
Сайн-Шанд	5,2	5,8	3,0	4,6
Китайская Народная Республика				
Хайлар	5,7	4,8	2,9	5,0
Харбин	5,8	4,0	3,9	5,5
Урумчи	8,6	4,9	2,6	7,3

Благодаря высокому уровню конденсации водяного пара осадки над Монголией часто испаряются, не достигая земли. Такие незначительные дожди измеряются в десятых долях миллиметра и отмечаются наблюдателями как следы осадков. Количество называемых «сеющих дождей» практически неизмеримо, но сопровождается увеличением облачности, повышением влажности и приносят, как правило, прохладу. Немаловажную роль играют при этом продолжительность осадков.

Исходными данными для расчета продолжительности и интенсивности осадков послужили ежедневные наблюдения (табл. ТМ за 10-летний период (1949—1958 гг.) и готовые материалы климатического справочника МНР [2]. Продолжительность осадков была получена для 12 станций путем подсчета фактической суммарной продолжительности дождя за сутки, месяц и далее за теплый период (май — октябрь). Наиболее подробно методика расчетов изложена в работах [3, 4]. Интенсивность осадков была получена за тот период и для тех же станций по формуле $I=R/S$, где R — количество осадков за сутки в миллиметрах, S — продолжительность осадков в течение суток в часах. К сожалению, мы не располагаем данными лент самописцев для расчета интенсивности за бо-

короткие интервалы времени (от часа к часу и в течение часа). Такие расчеты особенно интересны для анализа кратковременных дневных осадков большой интенсивности.

В табл. 1 даны средние значения продолжительности осадков в день с осадками для станций, расположенных в различных климатических районах Монголии и Китая.

Из содержания приведенной таблицы и других обработанных материалов следует общая закономерность распределения данных характеристики по сезонам. От зимы к лету она уменьшается примерно в 1,5—2 раза.

Рис. 4. Номограмма для расчета месячной продолжительности осадков теплого периода (май—октябрь).

Месячная суммарная продолжительность осадков распределяется от января к июлю совершенно иначе, так как число дней с дождем в 3—4 раза превышает число дней со снегом. Таким образом, средняя месячная продолжительность осадков следует в годовом ходе за количеством осадков, а средняя продолжительность в день с осадками имеет обратный годовой ход. В этом заключается одна из особенностей климата с летним максимумом осадков.

Для анализа приведена табл. 2 обеспеченности суммарной продолжительности за месяцы теплого периода. С учетом этих данных построена номограмма (рис. 4). Станции в таблице расположены в порядке увеличения средних значений месячной продолжительности. Поэтому хорошо видно, что самые кратковременные осадки выпадают в котловине больших озер, на северо-западе Монголии. Продолжительность осадков, осредненная с мая по октябрь, составляет здесь 19—22 ч (Улангом, Кобдо). На юге страны продолжительность осадков несколько выше — 24—30 ч (Дала-Дзадгад, Сайн-Шанд). На наветренных склонах Хангая, данные которым соответствуют верхней части вертикальной оси номограммы, средняя месячная продолжительность осадков наибольшая — 59 ч (Цэцэрлэг).

Возможные значения месячной продолжительности при указанных средних изменяются по территории от 0 до 164 ч. Следует обратить особое внимание на ст. Улясутай, где в июле 1950 г. при сравнительно небольшой месячной норме (65 мм) осадки выпадали в течение 164 ч. Однако продолжительные осадки наблюдаются в большей обеспеченностью в Цэцэрлэге, чем в Улясутае. Например, осадки продолжительностью выше 35 ч составляют в Цэцэрлэге 30%, а в Улясутае — 40%. Наветренные склоны Хангая по сравнению с другими районами Монголии наименее континентальны. Они в наилучшем образе увлажнены и за счет более высоких зимних температур воздуха имеют наименьшую в стране годовую

Таблица 3

**Повторяемость (%) интенсивности осадков
в различных пределах**

Станция	Градации интенсивности, мм/ч			
	<2	3—5,9	6—14,9	>15
Улан-Батор	88	11	0,8	0,2
Улясутай	84	15	1	—
Мурэн	83	16	0,6	0,4
Сайн-Шанд	89	8	3	—
Тамсаг-Булак	83	14	2,8	0,2
Цэцэрлэг	81	15	4	—
Далан-Дзадгад	85	10	5	—
Мандал-Гоби	81	14	4,8	0,2
Арбай-Хэрэ	76	20	3,6	0,4
Хонгор	75	20	4,2	0,8
Улангом	73	22	5	—

плитуду температуры воздуха (31°C). Например, в Цэцэрлэге в холодное время года средняя месячная температура воздуха на 10°C выше средней широтной и равна январской температуре Далан-Дзадгада, который расположен по широте на 4° южнее.

Интенсивность осадков представлена в статье в виде повторяемости: слабых — менее 2 мм/ч; средних — 3—5 мм/ч; сильных дождей — 6—15 мм/ч; ливней — более 15 мм/ч (табл. 3). Таблица составлена в порядке возрастания дождей большой интенсивности.

По повторяемости первой градации можно заключить, что дождей малой интенсивности (от 0 до 1,99 мм/ч) являются основными в режиме увлажнения страны. Они составляют 70—90% всех дождей.

Наибольший процент (20—28%) повторяемости средних и сильных дождей соответствует в основном пустынным станциям, количество и продолжительность осадков незначительны. Осадки интенсивностью более 15 мм/ч большей частью отсутствуют и составляют десятые доли процента.

Выводы

1. В условиях засушливого климата Монголии даже незначительные осадки сопровождаются увеличением облачности и влажности воздуха.

2. Дожди малой интенсивности (от 0 до 1,99 мм/ч) являются основными в режиме увлажнения страны. Они составляют 70—90% всех дождей.

3. Наибольший процент (20—28%) повторяемости средних (3—5 мм/ч) и сильных (6—15 мм/ч и более) дождей наблюдается в пустынных районах страны, где продолжительность и количество осадков незначительны. При годовой норме меньше 150 мм возможны осадки более 100 мм в сутки.

4. Продолжительность осадков, осредненная за теплый период (май—октябрь), изменяется по территории страны от 20—22 ч (котловина Больших озер) до 60 ч (наветренные склоны Ханга). В июле и августе продолжительность может составлять 120—170 ч.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Климаты Зарубежной Азии. Под ред. А. Н. Лебедева, И. Д. Копане Л., Гидрометеоздат, 1975. 448 с.
2. Климатический справочник Монгольской Народной Республики. Т. Улан-Батор, 1971. 339 с.
3. Лебедев А. Н. Продолжительность дождей на территории СССР. Гидрометеоздат, 1964. 510 с.
4. Сорочан О. Г. О методике расчета интенсивности атмосферных осадков.— «Тр. ГГО», 1969, вып. 247, с. 71—75.
5. Юнатов А. А. Основные черты растительного покрова МНР. М.—Изд-во АН СССР, 1950.— «Тр. Монгольской комиссии АН СССР», 1950, вып. М.—Л., Изд-во АН СССР, с. 25—40.

А. Ю. ЕГОРОВА

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

При исследовании относительной влажности воздуха всегда приходится иметь в виду, что ее распределение по земному шару определяется многочисленными факторами. К их числу относятся чисто физико-географические, циркуляционные и собственно климатологические. Под последними мы подразумеваем взаимосвязь исследуемого элемента с температурой воздуха, облачностью, осадками, циркуляционными процессами, периодическими и непериодическими их изменениями. И, конечно, во всех случаях, рассматривая эти взаимосвязи, следует помнить о физико-географических условиях исследуемого материка.

Южная Америка расположена в основном в тропических и экваториальных широтах. Субтропики и умеренные широты занимают относительно небольшие участки суши. Весьма существенное значение имеет меридиональное положение Анд, простирающихся вдоль всей прибрежной полосы — от крайней северной до крайней южной точки материка. Анды фактически служат непреступным барьером для всех циркуляционных систем, движущихся в восточном направлении. Немалое значение для географического распределения относительной влажности воздуха имеют циркуляционные механизмы, в частности западный перенос в умеренных широтах северо-восточный пассат, приносящий влажные экваториальные массы воздуха в бассейн Амазонской низменности и к восточному подножию тропической части Анд. Нельзя также не упомянуть форму самого материка в виде треугольника, острием направленного в холодные районы умеренной зоны южного полушария.

Все эти и многие другие факторы имеют решающее значение для формирования суточного хода элемента, распределения его по зонам и отдельным климатическим областям, изменения его от года к году. В результате взаимодействия многих факторов

Рис. 1. Средняя относительная влажность воздуха в январе

в одних районах постоянно влажно, в других — постоянно сухо. Такая устойчивость прослеживается по средним месячным значениям в различные сезоны (рис. 1).

Известно, что средние месячные значения дают только факт, и с точки зрения прикладных задач вряд ли имеют самостоятельную ценность.

Влажность воздуха.
июль.

ачение. Вместе с тем с их помощью удается в общих чертах разить многие особенности влажности воздуха.

Анализ карт показывает, что на протяжении всех морских побережий относительная влажность воздуха всегда высокая — 75—% . Во внутренних районах Бразилии испарение исключительно

Рис. 2. Распределение относительной влажности
 а — январь, уг

тажности воздуха.

— июль, день.

велико (1250—1500 мм в год) — средняя относительная влажность воздуха даже превышает 90%. По обширности территории и географическому положению это самое влажное место в мире. Летом эта область занимает более значительную часть суши, зимой. Во всех остальных районах материка средняя относительная влажность меньше. Самыми засушливыми являются тропические районы высокогорных склонов Анд и восточный выступ Марика на широте около 5—10°. В этих засушливых областях средние значения влажности варьируют в пределах 30—50%. Пониженная относительная влажность воздуха наблюдается вдоль восточного склона Анд. Этот «желоб» пониженной влажности очертывается изолинией 70% с центрами 30 и 40%. Пониженная средняя влажность весьма характерна для летних месяцев в Чили, Перу, Аргентине. На юге страны, даже на побережье Атлантики, средняя относительная влажность в январе не превышает 50—60%.

Так выглядит распределение относительной влажности в духа, вычисленной без учета времени суток. Те же средние месячные величины, но взятые за определенные части суток, дают совершенно другое представление о режиме относительной влажности воздуха. Ранние утренние значения относительной влажности еще не сильно измененные утренним солнечным теплом дают совершенно иное распределение ее на материке (рис. 2).

В ранние летние часы на обширнейшей территории северовосточной части материка относительная влажность в среднем составляет 90—95%. Фактически это почти вся Амазонская низменность. Исключением являются лишь самые верховья притока Амазонки. На тихоокеанском побережье, на побережье Атлантического океана (севернее 35° ю. ш.) и на побережье Карибского моря в утренние часы относительная влажность тоже всюду высокая — 80—85%. Сравнительно сухо утром только к востоку от Анд начиная от 20° ю. ш. и далее на юг до 45° ю. ш. Это преимущественно районы Аргентины. Здесь относительная влажность не превышает 50—60%, местами составляет даже 40%. В горах, очевидно, за счет сильных ночных понижений температуры влажность такая же высокая, как и на побережье (рис. 2).

Совершенно иное распределение относительной влажности воздуха наблюдается днем. На побережьях океанов и морей и на Амазонской низменности средняя относительная влажность в 13 ч почти всюду равна 70—80%, но при некотором удалении от моря она сразу понижается до 60—50%. Во внутренних районах суши, особенно вдоль восточных склонов Анд и у их подножий, относительная влажность составляет 30—40%, и редко где она повышается до 50%. Особенно малы значения дневной относительной влажности южнее параллели 20°.

Общая картина географического распределения относительной влажности воздуха в зимнее время (июль) существенно отличается от распределения в летнее время (январь), особенно в дневные

сы. Характер же распределения рассматриваемого элемента утренние часы зимой примерно такой же, как и летом. Отдельные особенности незначительны, поэтому мы остановимся на рассмотрении дневной карты (рис. 2 б).

Зимой, когда все циркуляционно-климатические зоны занимают айне северное положение, влияние северо-восточного пассата наazonскую низменность ослаблено. Не чувствуется в это время действия экваториальных муссонов. Таким образом, вся или почти вся территория Южной Америки находится в наиболее зашливых условиях. На Амазонской низменности относительнаяажность уменьшается до 65—75%, на Бразильском плоскогорье — до 40—50%, у восточных подножий Анд и на их восточныхлонах — до 40—30%, а местами и того меньше. Низкие значенияажности воздуха наблюдаются на высокогорных плато и в межрных долинах (20—30%). В целом почти на всей территории терика в дневные часы июля сухо. То же наблюдается и в другие зимние месяцы. Однако в юго-западной части материка, юже 35° ю. ш., находящейся под воздействием господствующего задного переноса, дождливо, облачно и влажно. Здесь и дневнаяажность сохраняется выше 70—80%, местами выше 85%, особенно на прибрежных островах.

Из анализа данных видно, как существенно отличаются средние месячные величины относительной влажности, вычисленные поедним суточным величинам, от средних месячных величин, высленных по срокам наблюдений. Особенно большая разница почается при сопоставлении дневных данных со средними суточными величинами.

Опыт исследования климатов Африки, Зарубежной Азии и тропических климатов вообще показывает, что нельзя глубоко познатьщность климата, если не привлекать ежедневных наблюдений.лько при обобщении последних можно полнее раскрыть структурукак отдельного элемента, так и климата в целом. Ежедневные данные позволяют также раскрыть взаимосвязь между отдельными метеорологическими элементами. При исследовании относительной влажности воздуха на территории Южной Америки использовались данные только ежедневных наблюдений. К сожалению,кой путь исследования климатов зарубежных стран, как правило, связан с ограниченным выбором данных. Чаще приходитсяивлекать к обработке сведения не за те годы и сроки, которые более интересны. Это замечание относится и к выбору самих пунктов наблюдений. Как правило, берутся такие пункты, по которым имеются данные, а не те, которые представляли бы больший научный и практический интерес, но по ним отсутствует информация. Часто приходится писать об этом потому, что многие из читателей практиков даже не представляют, как плохо обстоит дело с режимной информацией по зарубежным странам.

Параметры относительной влажности различной обеспеченности ежедневным наблюдениям вычислены большей частью для прежних станций, но с разделением на дневной и утренний сроки.

Таблица 1
Относительная влажность воздуха (%) различной обеспеченности. Утро (по ежедневным данным)

Станция	Месяц	Сред- няя	Макси- мальная	Обеспеченность, %											Мини- мальная
				5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	
Богота	I	78	95	93	90	87	83	81	79	77	75	73	67	60	48
	IV	76	95	90	87	84	81	79	76	74	71	68	63	59	52
	VII	74	92	89	86	84	81	78	75	72	69	67	63	59	46
	X	76	94	89	87	84	82	80	78	76	73	70	65	61	50
Джорджтаун	I	87	100	96	95	93	92	90	88	87	84	82	78	74	69
	IV	86	100	97	95	93	90	89	87	85	84	82	79	76	68
	VII	93	100	100	100	98	96	95	94	93	91	89	86	83	74
	X	88	100	97	95	93	92	91	89	88	86	84	82	80	77
Кито	I	92	98	98	98	97	96	95	93	92	91	88	80	75	66
	IV	91	99	99	98	97	96	95	94	92	90	87	83	80	67
	VII	83	99	97	95	92	89	86	83	81	77	74	70	66	62
	X	88	98	97	95	92	89	86	83	81	87	83	77	73	67
Лима	I	95	99	99	98	97	97	96	95	94	94	93	92	92	90
	IV	93	100	100	99	97	96	94	93	92	91	91	90	89	88
	VII	96	100	100	99	99	98	98	97	97	96	94	90	88	86
	X	97	100	100	100	99	99	98	97	97	96	95	94	94	92
Уанкайо	I	88	100	98	96	94	93	92	90	88	86	83	77	71	63
	IV	93	98	98	97	97	96	95	94	93	93	91	87	84	79
	VII	76	98	96	93	88	85	81	77	74	70	65	60	56	52
	X	83	100	97	95	92	90	88	85	81	78	74	68	64	45

Рио-де-Жанейро	VII	75	87	87	87	83	80	79	78	77	75	74	70	65	59	58
	X	68	74	74	72	72	71	70	70	69	68	66	64	61	59	59
	I	83	99	93	92	92	91	89	87	85	84	82	78	72	62	50
	IV	87	96	94	93	93	91	90	89	88	87	85	83	80	77	50
	VII	85	99	96	94	94	91	90	89	87	86	83	81	75	69	40
	X	82	95	93	92	92	89	88	86	84	82	79	77	71	66	57
Монтевидео	I	78	100	94	92	92	88	84	82	79	77	74	70	63	56	40
	IV	87	100	99	98	96	94	94	92	90	87	84	81	72	66	50
	VII	89	100	100	99	97	95	95	94	92	89	87	83	75	70	52
	X	84	100	98	97	95	92	92	90	86	83	79	73	66	61	51
	I	74	87	84	83	80	80	78	76	74	73	71	68	66	64	58
	IV	72	88	84	82	79	77	77	75	73	71	69	67	64	62	55
	VII	74	90	87	84	81	79	79	76	74	73	71	69	67	66	47
	X	72	85	81	80	78	76	76	74	72	71	70	68	66	64	61
	I	69	96	92	88	82	82	77	72	69	65	61	57	53	50	44
Сантьяго	IV	90	99	99	98	97	95	95	94	92	91	88	85	79	74	43
	VII	92	100	98	98	97	96	96	95	94	93	90	87	83	79	63
	X	79	98	98	93	89	89	86	83	80	77	75	71	65	58	44
	I	91	96	96	95	95	95	94	94	93	92	89	87	84	83	83
	IV	91	97	97	97	96	94	94	93	92	90	88	86	83	82	82
	VII	89	95	96	95	94	93	93	92	90	88	86	84	80	78	78
	X	90	96	96	96	94	94	93	92	91	89	88	85	83	82	82
	I	75	100	100	97	88	88	83	78	74	70	67	62	56	49	35
	IV	90	100	100	100	99	99	96	94	91	89	86	83	77	73	50
	VII	87	100	100	100	100	100	97	92	89	86	82	78	71	65	53
	X	72	100	100	100	90	83	83	77	72	66	61	55	49	43	25
	I	69	98	98	91	82	77	77	74	72	70	66	63	57	51	39
	IV	81	95	96	95	93	90	90	88	85	83	81	79	75	69	52
	VII	84	100	100	100	100	100	100	95	90	87	83	78	72	67	57
	X	75	100	100	100	95	88	88	83	79	76	72	67	60	55	46

Таблица 2
Относительная влажность воздуха (%) различной обеспеченности. День (по ежедневным данным)

Станция	Месяц	Сред- няя	Макси- мальная	Обеспеченность, %												Мини- мальная
				5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95		
Богоа	I	49	83	78	69	60	53	53	50	47	44	38	32	27	14	
	IV	57	93	85	76	68	62	59	56	53	50	46	40	36	29	
	VII	55	87	76	69	60	57	55	53	52	50	48	45	43	38	
	X	57	89	84	79	69	63	58	54	51	49	47	42	39	36	
Джорджтаун	I	75	95	92	88	83	79	77	74	72	71	69	67	65	62	
	IV	73	100	91	86	79	76	75	73	71	69	67	64	62	54	
	VII	75	100	92	87	83	79	76	74	72	71	70	67	65	57	
	X	67	100	85	77	71	69	67	66	65	65	64	62	61	56	
Кито	I	56	85	77	71	66	62	59	55	54	52	49	46	43	34	
	IV	63	96	83	77	72	69	66	63	60	58	54	51	48	42	
	VII	49	82	72	63	56	52	50	49	47	45	42	39	37	32	
	X	56	82	75	71	65	61	58	55	53	50	47	43	41	35	
Лима	I	63	86	74	70	68	67	65	63	62	61	59	56	52	46	
	IV	59	75	70	67	64	63	62	61	60	58	56	53	50	47	
	VII	73	94	84	82	80	77	76	74	72	70	67	63	61	46	
	X	65	88	79	75	70	68	66	64	63	62	61	58	55	50	
Уанкайо	I	45	80	71	66	57	52	48	44	40	36	33	29	25	12	
	IV	43	70	60	56	51	48	45	43	41	38	36	32	30	15	
	VII	34	51	46	44	41	39	38	36	34	31	28	24	21	17	
	X	39	76	58	53	47	43	40	37	35	33	31	27	22	12	

Кичерамобин

Рио-де-Жанейро	VII	47	61	61	59	55	53	50	48	46	43	39	33	30	30
	X	35	43	41	38	37	34	36	35	34	32	30	28	27	27
	I	71	95	88	84	81	70	77	73	70	65	58	51	47	34
	IV	71	93	85	82	79	71	76	73	71	67	62	56	51	39
	VII	67	95	85	80	76	63	72	68	63	59	54	49	45	38
	X	72	94	89	83	80	70	77	73	70	67	63	55	49	37
	I	53	100	79	69	63	51	58	54	51	45	37	29	23	13
	IV	58	98	83	74	67	54	61	58	54	50	45	38	33	19
	VII	70	97	90	83	78	66	74	70	66	61	57	52	48	40
	X	62	100	90	81	73	57	67	62	57	52	45	37	32	25
Арика	I	68	82	77	74	72	67	70	69	67	66	65	61	58	47
	IV	70	91	80	77	75	73	73	71	69	67	65	63	60	55
	VII	73	90	83	78	76	72	75	73	72	71	69	67	64	50
	X	71	80	78	76	74	73	73	72	71	70	67	65	64	62
	I	36	71	47	42	39	34	37	35	34	32	29	27	25	18
	IV	48	96	76	66	59	43	53	48	43	39	35	29	24	13
	VII	59	97	87	75	67	53	62	57	53	47	42	35	32	23
	X	44	83	68	61	52	38	46	42	38	35	31	27	24	22
	I	88	94	94	94	93	88	92	90	88	85	81	76	74	74
	IV	89	97	96	94	93	90	92	91	90	87	81	78	78	78
Сан-Педро	VII	87	94	89	83	81	88	89	88	86	83	81	80	79	79
	X	87	95	95	94	93	91	91	88	85	83	80	76	72	72
	I	43	100	77	62	51	44	44	38	34	30	27	23	20	14
	IV	57	100	86	76	69	62	56	56	50	45	40	35	32	21
	VII	51	100	84	74	63	48	48	43	38	33	33	26	20	14
	X	42	100	84	69	55	35	43	35	30	25	21	18	15	6
	I	57	91	80	73	68	64	64	60	56	53	48	42	36	25
	IV	70	100	96	87	81	78	74	74	71	68	62	53	45	28
	VII	74	99	99	95	89	84	79	79	74	70	66	58	52	36
	X	64	100	93	83	78	73	69	69	65	60	54	45	38	17

Результаты этих расчетов приведены в табл. 1 и 2. Для краткости данные приводятся только для месяцев — представителей сезонов (январь, апрель, июль, октябрь).

Данные табл. 1 и 2 показывают, что всюду в утренние часы изменчивость относительной влажности меньше, чем в дневные часы. Эту закономерность легко проследить по данным наблюдений горных, прибрежных и равнинных станций. Особенно большей изменчивостью отличаются характеристики относительной влажности высокогорных станций в сухой период года, когда суточные вариации температуры воздуха наибольшие, а месячные суммы осадков минимальные в году. Но поскольку в дождливое время года встречаются отдельные ясные бездождные дни, в которые радиационные условия мало отличаются от подобных условий в сухое время, то общая амплитуда колебаний влажности в обоих случаях оказывается почти одинаковой. Поэтому по годовому количеству осадков, представленному по одним многолетним средним значениям, вряд ли можно судить об изменчивости относительной влажности, рассчитанной по ежедневным данным. Так, в Боготе в июле при норме осадков 45 мм относительная влажность воздуха по обработанным данным варьирует от 46 до 92%, а в апреле при норме осадков 118 мм — от 52 до 95%. По дневным данным связь между значениями осадков в июле и апреле и экстремальными значениями относительной влажности воздуха еще более неопределенна. Такое несогласие в закономерностях распределения ежедневной относительной влажности воздуха и месячных норм осадков объясняется следующими причинами. Годовое количество осадков составляет 975 мм, причем между сухими и дождливыми месяцами нет особенно большой разницы. И в дождливые месяцы в год нередко сохраняется сравнительно сухая погода, характеризующаяся большими внутрисуточными колебаниями температуры и относительной влажности воздуха. Такие дни сглаживают основные различия в распределении ежедневных значений относительной влажности между сравнительно дождливыми и сухими периодами года. В районах, где годовой ход осадков по сезонам выступает более резко, обнаруживается определенная связь между влажностью воздуха и осадками. В частности, в Уанкайо (Перу) в июле при норме осадков 5 мм средняя дневная относительная влажность воздуха варьирует в пределах 15—50%, а в январе при норме 137 мм осадков — в пределах 10—80%. Эти различия проявляются и в значениях относительной влажности различной обеспеченности. В январе, в 50% дневных часов относительная влажность на 10% выше, чем в июле.

На морских и океанических побережьях, особенно на тихоокеанском, где влияние Перуанского течения проявляется особенно заметно, в утренние часы относительная влажность воздуха всегда очень высока, ее изменения от одного дня к другому незначительны. Классическим примером могут служить результаты расчетов в Лиме (столица Перу). Утром здесь почти никогда влажность не опускается ниже 85%, большей частью она сохраняется вы-

% . В январе, апреле, июле и октябре в 80% случаев ее значения были 90—94%.

Днем условия влажности становятся иными. Разности между максимальными и минимальными значениями возрастают до 30% и более. Так, в Лиме в наиболее сухие дни относительная влажность воздуха понижается до 45—50%. Такой сухой воздух бывает в часы выноса континентального воздуха в сторону океана. При зевитом морском бризе летом, весной и зимой дневная влажность

Рис. 3. Номограммы расчета относительной влажности воздуха в Южной Америке.

а — утро (ежедневные данные), б — день (ежедневные данные).

повышается до 85—95%. Иные погодные условия бывают осенью, когда даже максимальные значения элемента не превышают 75%. Однако при небольшом удалении от моря начинают заметно проявляться ослабление влияния моря и усиление континентальности. В этом отношении примером может служить ст. Сантьяго, где небольшая удаленность от моря и некоторая защищенность от него значительно обуславливают увеличение изменчивости относительной влажности воздуха от одного дня к другому.

Расчеты ежедневной относительной влажности воздуха различной обеспеченности, произведенные для утренних и дневных сроков наблюдений по большому объему информации, подверглись на номографированию. Закономерности распределения относительной влажности воздуха, как и других элементов климата, неоднократно описывались с помощью номограмм для территории Африки и Азии. Исследование распределения относительной влажности воздуха по территории Южной Америки с помощью номограмм проводится впервые. Представляло интерес проверить наш опыт номографирования относительной влажности на материалах именно по этому материка, который по пространственным и временным закономерностям климата имеет много специфических особенностей, связанных как с рельефом, циркуляцией и характером подстилающей поверхности, так и с влиянием окружающих океанов и морей, различными по своим термическим ресурсам.

На рис. 3 представлены две номограммы, одна из них описывает пространственно-временные закономерности распределения относительной влажности по территории материка в утренние часы, а другая — в дневные часы. Общим для обеих номограмм является их постепенное сужение в верхней части. Этот внешний признак показывает, что по мере увеличения средних значений (от 30 до 50%) разности между экстремальными значениями заметно уменьшаются, уменьшается и сама изменчивость элемента. Особенно хорошо это видно из левой части номограммы, которая характеризует повышение минимальных значений относительной влажности воздуха с общим увеличением средней величины. При средней влажности 90% в дневные часы относительная влажность практически не опускается ниже 60%, а в утренние — ниже 70%. По номограмме для утренних часов в 95% случаев относительная влажность воздуха при средней 60% больше 30%, при средней 70% больше 45%, при средней 80% больше 60% и при средней 90% больше 70%. Минимальная изменчивость элемента лежит на уровне средних около 90—95%. Эти величины наиболее характерны для морских побережий, особенно для тихоокеанского, омываемого холодным Перуанским течением. Сравнительно мала изменчивость влажности и на Амазонской низменности, но в некоторые дни, особенно в периоды малых осадков, возможны и низкие значения влажности воздуха.

Номограмма дневных значений относительной влажности воздуха по своему внешнему контуру ориентирует на максимальные возможные колебания влажности от минимальных значений в с

е, солнечные и безоблачные дни до максимальных величин в дни дождей и сплошной облачностью, при сильно увлажненной подстилающей поверхности. Так, уже при средних дневных величинах до 60% относительная влажность может колебаться от 10 до 95%. Это уже совсем другой режим, отличный от утреннего времени. При средней 60% в 70% случаев относительная влажность меньше 70% и только в 30% случаев она выше 70%, а в 5% случаев больше 80%.

Выводы

1. Анализ ежедневных данных показал, каким образом формируется режим влажности воздуха и в каких пределах возможны колебания утром и днем. На этом фоне получена количественная оценка повторяемости средней многолетней величины и, следовательно, ее достоверности.

2. Приведенные номограммы, составленные по данным ежедневных наблюдений, дают возможность лучше показать все особенности в распределении изучаемого элемента. Зная структуру элемента, всегда можно определить и общие погодноклиматические условия, при которых встречаются определенные характеристики влажности воздуха, с вполне определенной вероятностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Климаты Африки. Под ред. А. Н. Лебедева и О. Г. Сорочан. Л., Гидрометеоиздат, 1967. 488 с.
2. Параметры тропического климата для технических целей. Под ред. Н. Лебедева и В. И. Лашкова. Л., Гидрометеоиздат, 1973. 515 с.
3. Егорова А. Ю. Параметры климата островов Филиппинского архипелага Л., Гидрометеоиздат, 1975. 126 с.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ НАБЛЮДЕНИЙ ПО СКОРОСТИ ВЕТРА НА СТАНЦИЯХ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

Различия форм публикации данных и методики наблюдений, несоответствие периодов и сроков, разрозненность и несвоевременное поступление метеорологических изданий в нашу страну создают трудности при обобщении материала по скорости ветра по Южной Америке.

Сведения о скорости ветра обычно публикуются в ежегодниках издаваемых каждым государством отдельно. Иногда характеристики по ветру приводятся в климатологических справочниках в виде средних многолетних величин. Известны два справочника с такими данными — это справочники по Аргентине за период 1941—1950 гг. и Чили за период 1916—1945 гг.

Естественно, при анализе материала наблюдений наибольшую ценность представляют ежедневные данные, по которым можно судить об изменчивости элемента, преобладающем направлении сильного ветра, его вероятности и т. д. Однако ежедневные данные имеются всего лишь по 35 станциям, освещающим в основном климат Колумбии, Эквадора, Гвианы и Аргентины. Осредненные же ветровые характеристики за отдельные месяцы получены по всем государствам материка, в общей сложности по 130 станциям.

При обработке данных наблюдений по Южной Америке принята единая для всех государств форма представления скорости ветра — м/с. Для получения сравнимого материала средние суточные величины рассчитывались лишь по наблюдениям, проводимым не реже трех раз в сутки, так как двухразовые данные дают частые отклонения, превышающие 20% истинной средней. При исследовании показаний элемента предпочтение отдавалось наблюдениям за последние годы, даже если используемый период приходилось значительно сокращать. Такое решение принято на основании анализа однородности материала, который показал, что на станциях многих государств отмечается скачкообразное возрастание скоростей ветра с течением времени. Подобное изменение скорости

звано заменой старых приборов новыми, усовершенствованными, более чувствительными [1]. Раньше, например, в Чили, в 20-х годах, наблюдения на некоторых станциях проводились визуально по баллам шкалы Бофорта.

Длительности периодов использованных наблюдений на станциях различных государств существенно отличаются друг от друга.

В 20% случаев периоды наблюдений составляют 2—5 лет, 55% длительность периодов колеблется в пределах 6—10 лет, в 20% случаев имеем данные наблюдений за 11 лет и более.

С целью проверки надежности расчета средних многолетних значений скорости ветра из рядов различной длительности были оведены специальные проработки. Для нахождения целесообразного периода осреднения можно воспользоваться формулой ределения средней ошибки σ_N в предположении бессвязности данных:

$$\sigma_N = \frac{\sigma}{\sqrt{N}},$$

где σ — среднее квадратическое отклонение индивидуальных значений ряда, N — число лет в ограниченном ряду наблюдений.

Рис. 1. График зависимости между изменчивостью σ и средней скоростью ветра $\bar{x}$.

а — средние месячные значения, б — ежедневные значения.

За среднюю ошибку $\bar{\sigma}_N$ можно принять значение критерия оценки неоднородности ряда, которое характеризует точность полученных материалов наблюдений. Численно критерий неоднородности рядов по скорости ветра принято считать равным 10—15% от наиболее часто встречающихся в ряду значений. Таким образом, значение критерия неоднородности будет находиться в определенном соотношении со скоростью ветра.

Значения средних квадратических отклонений, вычисленные по данным наблюдений 12 станций за все месяцы, графически представлены на рис. 1 а в виде зависимости от средней скорости ветра рассматриваемых рядов. Снимая с графика значения σ , соответствующие определенным скоростям ветра, имеем возможность

Таблица 1

Период осреднения в зависимости от σ и $\bar{\sigma}_N$

Скорость ветра (м/с)	σ	$\bar{\sigma}_N$	N
1—2	0,1—0,5	0,15—0,3	1,5(0,4—2,7)
3—4	0,4—0,9	0,4—0,6	1,7(1,0—2,3)
5—6	0,7—1,5	0,7—0,9	1,9(1,0—2,8)

рассчитать целесообразные периоды осреднения наблюдений (табл. 1). Из-за значительного рассеяния точек на графике вычлены возможные минимальные и максимальные периоды продолжительности.

Из табл. 1 видно, что для получения средних многолетних величин с надежностью 68,3% (соответствует одинарному σ) достаточно иметь периоды длительностью 1—2 года. Если задается более высокая надежность определения многолетних величин, например 95,4% (при удвоенном σ), тогда длительность периода следует увеличить в четыре раза.

Таким образом, можно получить многолетние средние скорости ветра с достаточной степенью надежности (примерно 80%) в рядах длительностью 3—5 лет.

Полученный результат о целесообразной длительности периода осреднения многолетних величин можно проверить с помощью обработки ежедневных данных, используя ту же формулу определения N , приведенную выше.

Входящие в формулу средние квадратические отклонения получены по материалам десяти станций; представлены они в виде графика зависимости от средней скорости ветра рассматриваемого ряда (рис. 1 б). Из приведенного графика видно, что средние квадратические отклонения данных ежедневных наблюдений принимают значения, равные 1—4 м/с, вместо 0,2—0,8 м/с, характерных для средних месячных значений. Тем самым изменчивость ежедневных

ростей ветра примерно в пять раз превосходит изменчивость
дних месячных величин.

За среднюю ошибку $\bar{\sigma}_N$ можно принять критерий инструментальной точности измерения скорости ветра, который приравняется к 0,5 м/с.

Следовательно, если принять среднее квадратическое отклонение равным 4 м/с (наибольшим из возможных отклонений), а среднюю ошибку равной 0,5 м/с, тогда из формулы получим, что ряд должен состоять примерно из 60 величин ($N=4^2/0,5^2=64$) при обеспеченности 68,3%. Это количество членов ряда соответствует числу наблюдений, проводимых в течение одного месяца при двух или более наблюдениях за сутки. Задавая повышенную степень надежности, обеспеченностью 95,4% ($2\sigma=8$ м/с, $\bar{\sigma}_N=0,5$ м/с), получим ряд, состоящий из 260 членов, что соответствует периоду наблюдений в 3—4 года.

Таким образом, сравнения расчетов определения целесообразной длительности периодов осреднения независимо, как по средним месячным данным, так и по ежедневным, показали одинаковые результаты. Тем самым, полученные для некоторых станций Южной Америки средние месячные скорости ветра из рядов небольшой длительности (2—4 года) имеют допустимую степень точности пригодны для раскрытия особенностей ветрового режима над территорией.

Для удовлетворения практических запросов строительных организаций, помимо средних месячных величин, необходимы обоснованные сведения о вероятностях различных скоростей ветра. Например, сведения о возможных максимальных скоростях требуются при определении ветровых нагрузок на промышленные и жилые здания при их проектировании, а также для характеристики районов, опасных в ветровом отношении. В то же время частые слабые ветры способствуют загрязнению приземного слоя атмосферы в промышленных районах и крупных городах газообразными выбросами производства и автотранспорта; с этой точки зрения более благоприятными являются сильные ветры. Короче говоря, запросы о ветровых параметрах становятся с каждым годом все более конкретными и частыми.

Используя сведения о повторяемости тех или иных скоростей ветра, можно легко построить либо зримо представить себе возможные формы кривых распределения. Типичной кривой распределения повторяемости скорости ветра является асимметричная гистограмма. В связи с тем, что на большей части территории Южной Америки средние скорости ветра невелики и составляют 1—3 м/с, кривые распределения имеют либо резко скошенную форму с преобладанием повторяемостей с нулевой скоростью (j-образный тип распределения), либо кривые частот круто поднимаются от малых значений скорости до пика, затем постепенно опускаются почти экспоненциально к оси абсцисс. Ограниченность кривых распределения нулевым значением обуславливает преобладание положитель-

ных отклонений над отрицательными (положительная асимметрия).

Удобным показателем формы распределения кривой является коэффициент асимметрии, который можно вычислить по формуле

$$c_s = \frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^3 m_i}{N \sigma^3},$$

где x_i — срединное значение градации скорости ветра, $\bar{x}$ — средняя скорость ветра, m_i — повторяемость (частота).

Т а б л и ц а

Статистические характеристики рядов наблюдений по скорости ветра

Станция	Характеристика	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Бартика (Гайана)	c_s	0,7	1,0	0,8	0,4	1,4	1,2	0,4	2,0	1,6	1,1	0,6
	σ	1,3	1,3	1,4	1,8	1,3	1,5	1,6	1,6	1,5	1,3	1,3
	$\bar{x}$	1,4	1,4	1,5	1,4	1,1	1,4	1,8	1,5	1,2	1,2	1,4
Куюба (Бразилия)	c_s	1,1	1,2	1,3	1,7	1,6	1,2	1,3	1,3	0,7	2,4	1,2
	σ	2,3	2,1	2,2	2,1	2,2	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2
	$\bar{x}$	2,3	2,1	1,7	1,9	2,0	2,2	1,9	2,1	2,6	2,2	2,1
Сидней (Австралия)	c_s	-0,3	-0,5	0,2	0,1	0,5	0,6	0,7	0,2	0,2	0,5	0,0
	σ	2,6	3,0	3,3	2,4	2,7	3,2	2,9	2,6	2,4	3,2	3,1
	$\bar{x}$	5,6	5,4	4,6	4,2	4,1	4,0	4,0	4,0	3,9	5,3	5,0
Аделаида (Австралия)	c_s	0,2	-0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,9	0,4	0,2	0,0
	σ	2,8	2,2	2,4	2,0	1,9	1,9	2,3	3,1	2,4	2,6	2,3
	$\bar{x}$	4,9	4,0	4,1	3,6	3,4	3,5	4,0	4,6	3,9	4,2	4,1

В качестве примера в табл. 2 помещены коэффициенты асимметрии, характеризующие области со слабыми ветрами в Южной Америке. Для сравнения приведены также сведения по станциям с сильными ветрами (Австралия). Из таблицы видно, что на приведенных пунктах распределения скорости ветра по градациям имеют положительные коэффициенты асимметрии. Подобная устойчивость знака коэффициента характерна, пожалуй, только для рассматриваемого элемента. В зоне слабых ветров, где часто бывает штилевая погода и изменчивость скоростей (σ) небольшая, коэффициенты асимметрии очень велики и нередко превышают единицу. При больших скоростях ветра (4—6 м/с) коэффициент асимметрии обычно по величине значительно меньше и могут быть даже близкими к нулю, что характерно для нормального распределения.

Из представленных характеристик по скорости ветра, а также анализа по другим неприведенным здесь данным следует, что первый ход скорости ветра повсеместно слабо выражен. В связи с этим вероятности по градациям скоростей ветра и обеспеченности целесообразнее рассматривать в целом за весь год. Во-первых, это способствует более высокой степени надежности получения определяемых величин из-за увеличения в 12 раз (число месяцев в году) количества членов в каждом ряду. Во-вторых, как известно, целей строительства величины расчетных скоростей ветра определяются по наблюдениям за год.

Рис. 2. Номограмма для расчета скоростей ветра различной обеспеченности. Южная Америка.

а — распределение с умеренной асимметрией, б — распределение с сильной асимметрией.

Для станций Южной Америки были определены обеспеченности различных скоростей ветра за отдельные месяцы и для года в целом. В табл. 3 приведены эти величины только для года. В таблице дается также графа с указанием типов распределения каждого из рассматриваемых рядов. Оказалось, что резко скошенному типу распределения (j-образному) свойственна значительная повторяемость (около 30% и более от всех случаев в ряду) слабых ветров скоростью 0—1 м/с). Данный тип распределения обнаруживается большей частью в районах влажного тропического климата. Второй тип распределения, ограниченный колоколообразный (К), характеризуется незначительной повторяемостью слабых ветров средними годовыми скоростями, обычно превышающими 3 м/с. Этот тип распределения характерен для районов с ярко выраженной пассатной циркуляцией и для зоны умеренного климата с относительно сильными ветрами.

Благодаря существующей связи между средними месячными значениями и видом распределения скорости ветра материалы по

Скорости ветра (м/с) различной обеспеченности, полученные по ежедневным данным в сумме за год

Станция	Средняя	Максимальная	Обеспеченность, %							Ряд
			5	10	30	50	70	90	95	
Барранкилья (Колумбия)	4,8	≥ 23	9,8	8,2	5,8	4,4	3,2	1,8	1,2	
Модельин (Колумбия)	2,0	≥ 18	6,3	5,2	2,3	1,1	0,4	0,2	0,0	
Бартика (Гайана)	1,4	≥ 14	4,5	3,7	2,0	1,3	0,8	0,3	0,1	
Кайенна (Французская Гвиана)	2,3	≥ 11	6,0	5,1	2,9	1,6	0,7	0,2	0,1	
Кито (Эквадор)	3,0	≥ 13	8,1	7,1	5,0	3,4	1,4	0,3	0,1	
Куяба (Бразилия)	2,1	≥ 10	7,1	6,0	3,3	2,0	1,2	0,5	0,4	
Санта-Крус (Аргентина)	5,3	≥ 17	14,9	11,6	7,0	4,9	3,2	1,7	1,3	
Порт-Стэнли (Фолклендские (Мальвинские) о-ва)	8,8	≥ 18	15,5	13,7	10,7	8,9	6,9	3,4	1,9	

обеспеченностям обобщены в две группы с помощью графиков номограмм, где ось ординат соответствует средним месячным значениям, а ось абсцисс — возможным скоростям, наблюдающим в отдельные дни и сроки (рис. 2).

Обработанные материалы по скорости ветра позволили составить определенное представление о ветровом режиме Южной Америки. В общих чертах оно заключается в следующем. В тропических широтах, вблизи экватора, обычно наблюдаются слабые ветры средней скоростью 1—2 м/с. При этом безветрие бывает примерно в 30—50% случаев. Иногда, в момент формирования циклонических возмущений в зоне конвергенции воздушных масс, скорости могут достигать 5—10 м/с. На прибрежных станциях из развития бризовой циркуляции в зоне действия пассатов средние скорости составляют 3—4 м/с. Здесь в отдельных случаях скорости ветра могут превышать 10 м/с. В умеренных широтах, где вели-

широтные градиенты давления и сильно развита циклоническая деятельность, нередко ветры в сроки наблюдений достигают скорости 15 м/с и более. Вторжение на материк тропических циклонов с ветрами разрушительной силы метеорологическими станциями отмечалось.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Климатический справочник Южной Америки. Под ред. А. Н. Лебедева. Л., Гометеоиздат, 1975. 370 с.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ТЕЧЕНИЙ НАД ЮЖНОЙ АМЕРИКОЙ

Особенности строения барического поля определяют характер направления и скорость перемещения воздушных масс, тем самым обуславливая в значительной степени пространственный и временной ход всех основных метеорологических элементов.

Удобной и общепринятой формой представления материала наблюдений по давлению воздуха служат карты распределения средних месячных значений, приведенных к уровню моря. Для построения карт давления по Южной Америке привлечен цифровой материал 150 станций, опубликованный в работах [6, 7, 1]. Длительность использованных рядов наблюдений различна. В 50% случаев она составила 30 лет и более (преимущественно за 1931—1960 гг.) и в 38% случаев — от 10 до 29 лет и в 12% — менее 10 лет. Территория материка освещена данными неравномерно. Их вполне достаточно в южной половине материка (в субтропических и умеренных широтах) и мало в тропической зоне, тогда как именно тропические широты являются очагом формирования общей циркуляции атмосферы, где положения области экваториальной депрессии и внутритропической зоны конвергенции определяют основное распределение воздушных течений.

Длительность периода, необходимая для получения надежных средних многолетних значений давления воздуха (климатических норм), определяется изменчивостью средних месячных значений. По материалам О. М. Челпановой и Т. В. Коробейниковой [1] изменчивость давления воздуха, представленная средними квадратическими отклонениями σ , растет от экваториальных широт к умеренным и имеет порядок величин от 0,5—0,6 до 4,0 мб. Значения квадратических отклонений, осредненные за четыре месяца (январь, апрель, июль, октябрь), помещены в табл. 1. Для этих же станций вычислены средние ошибки σ_N по известной формуле $\sigma_N = \sigma / \sqrt{N}$ для рядов длительностью (N) 10 и 30 лет (в предположении бессвязности ряда).

Помещенные в табл. 1 значения средних ошибок обеспечивают лучение климатических норм с указанной точностью в доверительных границах $\pm\sigma$. Климатические нормы в доверительных границах $\pm 2\sigma$ (обеспеченностью 95,4%) получаются из 30-летних рядов со средними ошибками (больше табличных в два раза): $\pm 0,3$ мб в тропических широтах, $0,4-0,7$ мб в субтропических, $\pm 1,5$ мб в умеренных; из 10-летних рядов со средними ошибками: $0,4-0,5$ мб в тропических широтах, около 1 мб в субтропических и около 2 мб в умеренных.

Таблица 1

Средние квадратические отклонения (σ)
и средние ошибки ($\bar{\sigma}_{10}$, $\bar{\sigma}_{30}$)

Станция	Тип климата	σ	$\bar{\sigma}_{10}$	$\bar{\sigma}_{30}$
Турисау (Бразилия)	Тропический	0,6	0,19	0,11
Чиклайо (Перу)	"	0,8	0,25	0,14
Арика (Чили)	"	0,8	0,25	0,14
Пунта-Тортуга (Чили)	"	0,7	0,22	0,13
Рио-де-Жанейро (Бразилия)	Субтропический	1,2	0,38	0,22
Буэнос-Айрес (Аргентина)	"	1,8	0,57	0,33
Гуафо (Чили)	Умеренный	2,4	0,76	0,43
Сармьенто (Аргентина)	"	2,6	0,82	0,47
Пунта-Аренас (Чили)	"	4,0	1,27	0,73

Приведенные критерии точности показывают, что надежные климатические нормы со средней ошибкой в пределах ± 1 мб можно получить для всей территории материка из рядов длительностью 10 лет. Ряды длительностью 10 лет дают надежные климатические нормы с той же средней ошибкой только для тропической и субтропической зон. Необходимо отметить, что изменчивость давления воздуха на высокогорных станциях меньше, чем на низменных, следовательно, горные районы можно характеризовать относительно короткими рядами наблюдений.

На рис. 1 представлено распределение давления воздуха за январь и июль. Интервалы между нанесенными изобарами составляют 2 мб. Это условие построения карт удовлетворяет правилу проведения изолиний, интервал между которыми должен быть равен или больше удвоенной величины средней ошибки ($2\sigma_N$).

Как видно из приведенных рисунков, на территории Южной Америки и окружающей акватории в течение года удерживается определенное распределение барических образований, степень

Рис. 1. Атмосферное давление
 а — январь,

мб) на уровне моря.

— июль.

Рис. 2. Преобладающие направления ветров
а — январь

проявления которых меняется несущественно. Центральная часть материка, примерно от экватора и до 30° ю. ш., занята областью экваториальной депрессии. Эта область ограничена на карте изобарами 1010 и 1012 мб. Положение области низкого давления можно проследить по картам во все сезоны. Она выступает либо в виде

здушных масс.
— июль.

мкнутых изобар летом (январь), либо в виде ложбины низкого влечения зимой (июль). Минимальная величина давления в области депрессии (1006 мб) отмечается в январе. В это время центр депрессии располагается на широте Южного тропика, над территорией Парагвая, самой прогретой в летнее время частью материка.

Вообще же поле давления в области экваториальной депрессии очень размыто, градиенты давления малы.

В зоне 30—40° ю. ш., южнее экваториальной области низкого давления, простирается пояс высокого давления, являющийся перемычкой между двумя океаническими антициклонами, которые находятся по обе стороны от материка. Максимальное давление здесь достигает 1018—1020 мб (в июле). Известно, что разность давлений между центрами антициклонов и центром экваториальной депрессии определяет мощность и глубину проникновения пассатов на территорию Южной Америки.

На участке от субтропического пояса до южной оконечности материка давление падает, при этом минимальная величина давления составляет 1000—998 мб. Этот резкий перепад давления способствует формированию в умеренных широтах довольно устойчивых западных течений.

Карты барического поля позволяют наметить положение оси экваториальной депрессии, которая, казалось бы, должна служить зоной конвергенции воздушных масс южного и северного полушарий. Положение оси депрессии заметно смещается от сезона к сезону: от 23° ю. ш. в январе до 5° ю. ш. в июле. Однако как показали спутниковые наблюдения над облачностью [2, 3] мощный кучево-дождевой покров, определяющий положение зоны конвергенции, располагается севернее оси депрессии. Зона кучевой облачности лежит примерно на 0—5° ю. ш., незначительно перемещаясь в течение года. Различие в положении оси экваториальной депрессии и основной зоны конвергенции воздушных масс подтверждается материалами наблюдений по направлению ветров.

Согласование и анализ сведений по давлению воздуха и направлению ветра позволили дополнительно построить карты линий тока (рис. 2). Из конфигурации линий тока видно, что область сходимости пассатов занимает по площади обширную территорию. С юга эту область можно ограничить осью экваториальной депрессии, а с севера — линией, которая соответствует пути перемещения атмосферных возмущений, т. е. полосе с мощным покровом кучевой облачности и максимальным выпадением ливневых осадков. Следовательно, можно предположить, что при вторжении пассатов в область экваториальной депрессии над материком формируются две зоны конвергенции. Одна из них, основная, характеризуется мощной экваториальной конвекцией влажных воздушных масс, вторая, второстепенная, соответствует оси экваториальной депрессии (рис. 2 а).

Предположение о возможности формирования двух и более зон конвергенции в тропиках высказано Хастенрачем [8], Сэвеем [9] и др. и подтверждено картами погоды [4]. Хастенрач считает, что традиционная модель циркуляции атмосферы, объясняющая подъем воздуха в зоне сходимости пассатов у экватора в ячейке Гадлея, в отдельных случаях несколько усложняется. А именно в низких широтах может образоваться дополнительная экваториальная ячейка, которая располагается между циркуляционным

Рис. 3. Распределение муссонных областей.

чейками Гадлея. В этом случае, помимо основной зоны восходящего движения воздуха в зоне экватора, на некотором расстоянии от нее формируется дополнительная зона вертикальных перемещений.

Своеобразие погоды в зоне экваториальных широт в Атлантическом океане у берегов Бразилии описано известным мореплава-

телем Слокамом [5], совершившим в одиночку кругосветное путешествие на маленьком шлюпе «Спрей»... «На юге 14 сентября показались закрывающие солнце тяжелые дождевые облака — зловещий признак экваториальной штилевой полосы. Через день «Спрей» вошел в этот мрачный район, где ему предстояло либо бороться со шквалами, либо стать жертвой полного безветрия. Такой характер полосы, расположенной между районами северо-восточных пассатов, которые наносят удары попеременно и образуют завихрения воздуха, дующие во все стороны. Еще досаждают мреплавателям поверхность моря, покрытая мелкой рябью. Д

Т а б л и ц а

Вероятность различных направлений ветра. Муссонные области

Станция	Месяц	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
Араука	I	0	54	1	0	0	0	0	1	44
	VII	1	13	2	2	8	4	2	1	67
Терезина	I	10	17	2	13	2	1	2	8	45
	VII	0	8	1	46	1	6	1	2	35
Темуко	I	1	7	0	1	1	52	12	22	4
	VII	7	54	1	0	0	9	8	17	4
Вальдивия	I	11	1	0	1	42	11	29	3	2
	VII	36	1	1	0	31	8	16	5	2

полноты впечатления сверху круглосуточно хлещет дождь, лишаящий человека элементарных удобств. На протяжении десяти дней «Спрей» боролся и метался в таких условиях, продвинувшись по курсу всего на 300 миль».

На территории материка, помимо обширной экваториальной области с неустойчивыми ветрами, выделяются значительных размеров районы, занятые северо-восточными и юго-восточными пассатами. Устойчивые пассатные ветры особенно четко проявляются на побережье Атлантического океана. На противоположном тихоокеанском побережье материка, вдоль узкой береговой полосы, изолированной горной системой Анд от основной части материка пассаты, как правило, имеют нужную и юго-западную составляющую.

Обычно в тропических широтах сильно развиты муссоны, сезонные воздушные течения с резким изменением преобладающего направления ветра от зимы к лету и от лета к зиме. Классическим примером служат муссоны Индии, Индонезии и Африки.

В Южной Америке муссоны играют лишь местную ограниченную роль и выражены слабо. Муссоннообразная смена ветров наблюдается

и в двух областях материка. Одна из них, более обширная, занимает узкую приэкваториальную полосу, вторая располагается или на территории между городами Сантьяго на севере и Гаа на юге. На рис. 3 представлено распределение областей с муссонной циркуляцией. Приведены также станции, где данные наблюдений указывают на смену направлений на противоположные по отношению к затуханию преобладающего ветра до шторма.

Границы приэкваториальной муссонной области соответствуют мерно положениям внутритропической зоны конвергенции в январе и июле. В течение года приэкваториальная муссонная область поочередно подвергается действию пассатов либо северного, либо южного полушария. Во все месяцы здесь велика ветвистость штормов, их повторяемость в отдельные месяцы может достигать 50—60%. Подтверждением служат цифровые материалы, приведенные в табл. 2, для первых двух станций.

В Чилийской муссонной области смена ветров вызвана существенным изменением температуры воздуха подстилающей поверхности от сезона к сезону. Здесь почти не бывает штормов, как это видно из цифровых данных по станциям Темуко и Вальдивия (табл. 2). Летом (в январе) воздушный поток направлен обычно океана на прогретое побережье суши и имеет юго-западные составляющие ветра в 40—50% случаев. Цепи гор придают воздушным течениям направление, несколько параллельное хребтам. Зимой (июль) воздушные потоки направлены с побережья в сторону суши и имеют северные и северо-восточные составляющие с ветвистостью 40—60%. На территории этой небольшой области муссоны способствуют увеличению осадков до 2000 мм на общем фоне недостаточности дождей в прилегающих районах — пустыне Атакама (на севере) и сухой пампе (на западе).

В умеренном климатическом поясе, к югу от 40° ю. ш., где межротные градиенты давления велики, преобладающие западные потоки воздуха часто сменяются ураганскими ветрами неустойчивых направлений фронтальных циклонов. Погоду на юге материка океан описывает следующим образом... «Я взял курс на Магелланов пролив, это подлинное чудовище юга. 11 февраля «Спрей» ощутил Кабо-Вирхенес и вошел в суровый и мрачный пролив, где всю мощь дул ветер и гнал белоснежную пену. Порывистые валы дождя, налетевшие с северо-запада, чередовались с северо-восточными ураганами. На юго-западе виднелась белая дуга — главный признак приближавшегося от мыса Горн шторма. Я все хотел закрепить. И тут ураган, словно пушечный выстрел, ударил по судну. Он ревел не переставая в течение тридцати часов. Нигде в мире не встретишь такого бурного моря, как в диких бухтах м. Горн. Град и снег с дождем хлестали всю ночь напролет. День обещал хорошую погоду, но на Огненной земле надевание положиться нельзя. Неожиданно налетел такой ветер, что «Спрей», стоявший на двух якорях, был сорван с места и как рыбка отброшен из бухты. Нет ничего удивительного, что деревья не растут на склонах этой горы. О, великий Борей! Ведь

дерево должно состоять из одних корней, чтобы выдержать та бешенный порыв ветра».

Сильные ветры на южной оконечности материка усугубляю соседством его с бескрайними просторами океанов, над котор ветры почти никогда не стихают. Например, по сведениям ст. По Стенли (Фолклендские о-ва), скорости ветра в 80% наблюде превышают 5—6 м/с при средней годовой скорости 9 м/с.

Особенности рельефа материка — мощная система Анд, п тянувшаяся с севера на юг вдоль его западной окраины, и отню тельно невысокие Гвианское и Бразильское плоскогорья на воо ке, способствуют образованию местных ветров.

В метеорологических работах [10, 11] упоминается приме 30 различных видов таких ветров. Чаще других встречаются с сания памперо, норте, темпораль, виразон, тирраль и некоторо своеобразных горно-долинных ветров. Так, например, памперо характерен для Аргентины и Парагвая. Это штормовой холодн южный ветер, который дует обычно со стороны пампы, т. е. сте южного течения р. Параны. По своей природе памперо предст ляет фронтальное вторжение холодных воздушных масс, пере щающихся по тыловой части циклона. Существует несколько вид этого ветра: памперо без дождя, памперо с продолжительными до дьями либо с интенсивными грозовыми шквалами. Прямо проти положные отличительные свойства имеет в этих же областях верный ветер — норте, теплый и влажный. Он также обусловл воздушными потоками в циклоне, но только по его передней час Поэтому обычно теплому норте на смену приходит южный хол дный памперо.

Темпоралем называют западный ветер в Центральном Чили. наблюдается зимой и почти всегда сопровождается сильными л иями на побережье и густыми снегопадами в горах. Виразон и т раль — испанские названия морских и береговых бризов. Бри отмечаются на всех прибрежных станциях материка при ясн и малооблачной погоде. Там, где морские бризы по направле совпадают с господствующими воздушными течениями, они мо усиливаться до штормовой силы, тогда как береговые бризы осл бевают и становятся еле ощутимыми. Например, в Вальпараи из-за сильного морского бриза в послеполуденные часы обыч жизнь в городе замирает — улицы становятся безлюдными, торго ля прерывается и даже иногда прекращается работа в порту.

Несколько различных названий имеют горные и долинные ве ры. Жунта — ураганный ветер на перевалах Боливии в дневное вр мя и подобный ему йолка в Северном Перу. Теплый фёновый вете опускающийся с гор, в Аргентине носит название зонда, а в Ю ном Чили — пульхе и т. д.

Таким образом, своеобразие циркуляции атмосферы над Южн Америкой, приток влажных масс воздуха с океана способствуют смягчению климата, сравнительно благоприятному увлажнени территории, ограничению зоны пустынь, уменьшению контраста те ператур по сезонам и широте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Челпанова О. М., Коробейникова Т. В. Среднее многолетнее давление воздуха над океанами. Л., Гидрометеиздат, 1974. 112 с.
2. Снитковский А. И. Внутритропическая зона конвергенции в восточной части Тихого океана. «Метеорология и гидрология», 1972, № 11, с. 14—26.
3. Крыжановская А. П. Перемещение циклонических возмущений в тропической зоне.— «Тр. Гидрометцентра СССР», 1972, вып. 107, с. 85—98.
4. Кружкова Т. С. О сезонной миграции внутритропической зоны конвергенции в восточном полушарии.— «Тр. ЦИП», 1966, вып. 152, с. 53—67.
5. Слокам Д. Один под парусами вокруг света. (Пер. с англ.). М., Географгиз, 1960. 110 с.
6. World Weather Records, 1951—1960. Washington, 1966, vol. 3. 355 p.
7. Climatological normals (clino) for climate and climate ship stations for period 1931—1960. WMO—OMM N 117, Tr. 52, Geneva, 1971. 212 p.
8. Hastenrath S. L. On mean meridional circulations in the tropics.—, «J. Geophys. Sci.», 1968, vol. 25, N 6, p. 979—983.
9. Sawyer J. S. Large-scale disturbance of the equatorial atmosphere.— «Meteorol. Magazine», 1970, vol. 99, N 1170. 10 p.
10. Schamp H. Die Winde der Erde und ihre Namen.—Katalog. Wiesbaden, 1964. 190 S.
11. Knoch K. Klimakunde von Südamerika.—Handb. der Klimatologie, Bd 2, T. G. Berlin. 347 S.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПАСМУРНОГО СОСТОЯНИЯ НЕБА И ОСАДКИ НАД ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ АЗИЕЙ

Облачность как элемент климата может рассматриваться самостоятельно или в комплексе с другими элементами, в частности с осадками. Это вполне очевидно, так как закономерности пространственно-временного распределения облачности и осадков имеют много общего. Для территории Зарубежной Азии эти оба элемента исследованы достаточно подробно [1].

Настоящая статья является дополнением выполненного исследования. В ней нашли отражение материалы, не вошедшие в упомянутую монографию. Это в основном вероятностные характеристики облачности: обеспеченности каждого балла облаков и вероятность пасмурного состояния неба (8—10 баллов). Исходными данными послужили данные ежедневных наблюдений за общей облачностью на территории Монголии (за период 1951—1956 гг.), Иреи (1905—1936 гг.) и Китая (1951—1954 гг.).

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы (использованы срочные данные ежедневных наблюдений) с определенной точностью позволяют оценить режим облачности по 5—6-летним периодам. Для Китая и Монголии эти периоды включают как засушливые годы, так и влажные. Например, летом 1954 г. на реке Янцзы и Хуанхэ отмечалось самое большое наводнение за последние 100 лет. Вероятностные характеристики ясного (0—2 балла), полужасного (3—7 баллов) и пасмурного (8—10 баллов) неба для января, апреля, июля и октября рассчитаны для 120 станций. Результаты расчетов изданы в справочнике, а к настоящему времени они послужили основой для построения карт повторяемости пасмурного состояния неба для января и июля. В дальнейшем карты могут быть уточнены за счет спутников информации, так как данные наблюдений на станциях почти не освещают пустынных районов Синьцзяня и высокогорий Тибета.

Обеспеченности каждого балла облаков по срокам 1, 14, 19 были получены в опытным порядке для ограниченной сети станций.

гая. В отличие от ранее использованных показателей облачно- , данные по обеспеченностям отметок по всем баллам показы- от частоту появления той или иной степени покрытия неба обла- и позволяют оценить, в каких пределах эта характеристика еняется при соответствующем ей среднем значении. преимуще- о такого подхода к анализу ежедневных наблюдений за облач- тью заключается в том, что средняя облачность рассматривает- в связи с возможными отметками всех баллов. Известно, что дние характеристики, представленные так широко в климати- ких справочниках по зарубежной территории, совершенно не по- ательны, даже если учитывается изменчивость ее от года оду. В табл. 1 приведены средние за январь и июль значения ачности по срокам и обеспеченности каждого балла облаков и отдельных пунктов Китая. Стан- и расположены в различных фи- о-географических условиях. В яре средняя по срокам изменя- я от 3 до 10 баллов, а в июле — 5 до 10 баллов. Средние месяче- е значения, без учета сроков, из- няются еще в меньших пределах. июле, например, все средние зна- ния общей облачности укладываются в пределах 4—8 баллов для ей территории. Однако по данным еспеченностей нетрудно увидеть, о в январе и июле возможны от- тки баллов от 0 до 10 баллов. и этом вероятность сплошного крытия неба облаками (10 бал- в) при том или ином среднем зна- нии различна. При средних зна- ниях общей облачности, равных 4 баллам, обеспеченность десяти- льной отметки составляет 10— %, а при 7—9 баллах — 60—70%.

Рис. 1. Интегральные кривые распределения общей облачности по срокам.

а — Хайлар, октябрь; б — Цзуньи, январь; 1 — 7 ч, 2 — 13 ч, 3 — 19 ч.

Поскольку средние по срокам дают довольно сглаженную картину суточного распределения облачности, мы попытались представить распределение по срокам в виде интегральных кривых, которых снимались характеристики обеспеченности каждого балла. Типизация кривых по характеру суточного хода облачности позволила выявить на территории Китая два основных типа суточного хода (рис. 1). Наиболее распространенным является ослеполуденный максимум облаков (рис. 1 а). Он проявляется во все рассмотренные месяцы и особенно четко в апреле, когда контрасты ночных и дневных температур воздуха наибольшие. Тренний или ночной максимум (рис. 1 б) характерен для прибрежных районов и для южных широт Китая, где преобладают слоистые формы облачности. Наряду с указанными типами суточного

Обеспеченность количества облаков по баллам (0—10). КНР

Станция	Срок, ч	Среднее количество облаков	Максимальное количество облаков	Обеспеченность, %											Минимальное количество облаков	
				5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95		
Январь																
Хайлар	07	3	10	10	10	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13	4	10	10	10	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	
	19	3	10	10	10	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Цицикар	07	3	10	10	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13	4	10	10	10	10	6	2	1	1	0	0	0	0	0	
	19	3	10	10	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Шеньян	07	3	10	10	10	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	13	4	10	10	10	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	
	19	3	10	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Аньси	06	4	10	10	10	10	8	3	2	1	0	0	0	0	0	
	14	6	10	10	10	10	10	7	4	2	1	0	0	0	0	
	21	3	10	10	10	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
Вэньчжоу	06	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	0	0	
	14	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	1	0	0	
	21	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	1	0	0	
Гуйян	06	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	14	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	4	1	
	21	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	0	0	
Шаньтоу	06	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	1	0	
	14	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	2	0	0	
	21	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	1	0	0	
Июль																
Хайлар	07	6	10	10	10	10	10	9	6	4	2	1	0	0	0	
	13	7	10	10	10	10	10	10	9	7	5	3	1	0	0	
	19	5	10	10	10	10	10	7	5	3	2	0	0	0	0	
Цицикар	07	5	10	10	10	10	10	9	5	2	1	0	0	0	0	
	13	6	10	10	10	10	10	10	8	6	4	2	0	0	0	
	19	5	10	10	10	10	10	8	4	3	1	0	0	0	0	
Мукден	07	6	10	10	10	10	10	10	9	5	1	0	0	0	0	
	13	7	10	10	10	10	10	10	10	8	5	2	0	0	0	
	19	6	10	10	10	10	10	10	7	3	1	0	0	0	0	

Станция	Срок, ч	Среднее количество облаков	Максимальное количество облаков	Обеспеченность, %											Минимальное количество облаков
				5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	

И ю л ь

Си	06	6	10	10	10	10	10	10	10	8	3	1	1	0	0	0
	14	6	10	10	10	10	10	10	8	7	5	3	2	1	0	0
	21	5	10	10	10	10	10	10	8	5	3	1	1	0	0	0
ьжоу	06	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	2	1	0
	14	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	2	1	0
	21	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	2	1	0
ян	06	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	2	0
	14	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	6	3	0
	21	8	10	10	10	10	10	10	10	9	7	4	1	0	0	
тоу	06	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	6	2	1	0
	14	8	10	10	10	10	10	10	10	9	8	4	2	1	0	
	21	7	10	10	10	10	10	10	10	10	6	3	1	0	0	

да выделились районы, где распределение облачности по срокам можно представить одной интегральной кривой.

Своеобразие распределения облачности в суточном и годовом ходе над Центральной и Восточной Азией связано главным образом с особенностями атмосферной циркуляции и рельефом местности. Периодическая смена воздушных потоков зимой и летом на противоположные направления полностью определяют муссонный климат исследуемого региона. Летом над всей территорией имеет место максимум облачности и осадков, а зимой — минимум. Исключение составляет бассейн верховья р. Янцзы, где в течение всего года повторяемость пасмурного состояния неба составляет 70—80%, а количество выпавших осадков сильно различается. Интересно заметить, что при одинаковой повторяемости (70—80%) пасмурного неба январские суммы осадков изменяются по территории от 70 мм, в июле они составляют 100—350 мм, а на высокогорной станции Эмей (в Тибете) при той же повторяемости градационная облачность 8—10 баллов выпадает в среднем около 500 мм дождя.

Таким образом, выпадение осадков только отчасти зависит от степени покрытия неба облаками, в частности и от повторяемости пасмурного неба, в большей мере они зависят от структуры и физических свойств облачности.

Зимой над территорией Восточной Азии преобладает сухой холодный континентальный воздух сибирского антициклона,

который распространяется на юг и через Монголию. В результате над Монголией и северными районами Китая область сравнительно небольшая. Это в основном облака среднего и верхнего ярусов, а облака нижнего яруса и облака вертикального развития, из которых возможно выпадение осадков, в основном отсутствуют или составляют небольшой процент от общей области. Повторяемость пасмурного состояния неба над Монголией не превышает в январе 20—30%, а повторяемость ясного неба составляет 60—70%. Над Кореей повторяемость облачности 8—10 баллов несколько выше (20—45%). В этих же пределах изменяется вероятность пасмурного неба в северных предгорьях Тибета. К процессу облакообразования увеличивается довольно заметно, и к югу Янцзы повторяемость градации 8—10 баллов составляет 60—90%. Заметим, что на карте выделяется широтный пояс повторяемости облачности 8—10 баллов, равной 50—60%, который как бы разделяет материк Зарубежной Азии на две зоны—северную и южную. Этот переходный пояс хорошо совпадает с положением южной части струйного течения, южная ветвь которого расположена во впадине 27° с. ш., а северная—около 43° с. ш. Стеkanie к оси струйного течения воздушных масс северного и южного происхождения способствует увеличению повторяемости пасмурного неба в этих широтах. Усиленный процесс облакообразования над побережьем Восточной Азии связан с тем, что воздушные массы восточной периферии сибирского антициклона увлажняются при прохождении над окраинными морями и западной частью Тихого океана.

От зимы к весне интенсивность струйного течения на юге Тибетского нагорья ослабевает. Переходный широтный пояс пространства пасмурного неба, о котором упоминалось выше, сдвигается на север. Над Монголией повторяемость градации 8—10 баллов не превышает в апреле 45%, а над Кореей составляет 27—37%.

Таким образом, область вероятности пасмурного неба выше 60% к весне становится больше, чем зимой. В южных широтах Китая вероятность градации 8—10 баллов, как и в январе, мая большая на исследуемой территории (70—80%).

В летний период над южным Китаем господствуют юго-западный и юго-восточный муссоны, а на востоке—восточный муссон. Мощные потоки теплого и влажного воздуха, направленные в глубь континента, способствуют общему увеличению облаков и изменению их структуры. Над всей территорией увеличивается процент повторяемости облаков нижнего яруса и облаков вертикального развития, что свидетельствует об усилении фронтальной деятельности и увеличении осадков в летние месяцы.

На общем фоне увеличения облачности на карте июля сохраняются две зоны повторяемости пасмурного состояния неба: зона юго-западного и юго-восточного муссонов, расположенная южнее 35° с. ш., и зона восточного муссона, расположенная севернее 35° с. ш. К югу от этой широты повторяемость градации 8—

лов увеличивается от 60 до 90%, а к северу она почти не мется (50—60%). Только в пустынных районах Центральной Азии повторяемость пасмурного неба незначительна (20—30%).

Осенний период связан с отступлением летнего муссона. В окрестностях над большей частью исследуемой территории наблюдается заметное уменьшение вероятности пасмурного неба. Характер распределения облачности в октябре оказывается более сходным с летним распределением облаков, чем с летним. Например, над рекой и над побережьем Восточной Азии повторяемость пасмурного неба в октябре значительно меньше (13—26%), чем в другие рассмотренные месяцы. Только в южных широтах Китая и особенно юго-востоке Тибета повторяемость пасмурного неба по-прежнему велика. В январе, апреле, июле и октябре она меняется в пределах 70—95%. Это примечательное явление хорошо согласуется с влажностью данной местности, где выпадают самые продолжительные дожди. Именно на этот район Китая приходится максимум дней с осадками. В среднем он составляет около 200 дней в году.

Таким образом, район высокой повторяемости пасмурного неба юго-востоке Тибета является, по-видимому, районом интенсивной конденсации водяного пара, поступающего с западным переломом. Определенную роль играют при этом выносы влаги с Тихого океана (высотные восточные волны). Он образуется в результате защитного действия Тибетского нагорья и именуется в литературе как район «стоячей воды» [3].

Выводы

1. Обычно для характеристики облачности привлекаются средние величины или повторяемости по градациям (0—2, 3—7, 8—баллов). Последние даются в числах дней или процентах. Более тщательная проработка материалов показала, что среднее количество облаков связано с вероятностью каждого балла. Число случаев той или иной отметкой имеет вполне определенную вероятность.

2. При средних значениях общего количества облаков, равных 4 баллам, обеспеченность десятибалльной отметки составляет 20%, а при 7—9 баллов — 60—70%.

3. Количество осадков слабо зависит от повторяемости пасмурного состояния неба по общей облачности. При повторяемости градаций 8—10 баллов от 40 до 80% июльские суммы осадков изменяются от 5 до 500 мм. Январские суммы осадков при той же повторяемости пасмурного неба не превышают 70 мм.

4. Бассейн верховья р. Янцзы (на юго-востоке Тибета) можно считать районом интенсивной конденсации водяного пара. Повторяемость пасмурного состояния неба во все сезоны года велика (80—90%). Здесь отмечены наибольшие на исследуемой территории продолжительность осадков и число дней с осадками (190—200 дней в году).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Климаты Зарубежной Азии. Под ред. А. Н. Лебедева, И. Д. Копане Л., Гидрометеоздат, 1975. 448 с.
2. Климатический справочник Зарубежной Азии. Ч. П. Под ред. А. Н. Лебедева, А. Ю. Егоровой. Л., Гидрометеоздат, 1974. 653 с.
3. Климатические характеристики облачности за период МГГ и МГС. Северное полушарие. Вып. 2. М., 1965.
4. On the General Circulation over Eastern Asia (I).—„Tellus”, 1957, vol. N 4, p. 432—446.

В. П. ХОДАКОВА

ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ СУММАРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

Данные по солнечной радиации используются при исследовании истории климата и находят применение во многих областях практики (строительство, медицина, сельское хозяйство).

Результаты исследования радиационных условий зарубежной территории изложены в работах М. И. Будыко [3], Т. Г. Берлянд [2, 6] и др. В настоящее время в связи с поступлением новых гинометрических материалов из ряда стран появилась возможность более подробно рассмотреть некоторые характерные особенности распределения солнечной радиации на территории Южной Америки.

Поступление большого количества солнечного тепла в течение года является следствием географического положения Южной Америки, расположенной преимущественно в экваториальных и тропических широтах.

Как известно, часовые суммы солнечной радиации определяются высотой солнца, характером облачности и прозрачностью атмосферы. В отдельные дни в связи со значительным колебанием количества облаков могут существенно изменяться величины суммарной радиации.

На рис. 1 приведен суточный ход средних часовых сумм суммарной солнечной радиации для трех пунктов — Уанкайо (1956—1959 гг.), Буэнос-Айрес (1964, 1967—1968 гг.), Порт-Стенли (1957—1959, 1964—1966 гг.), находящихся в различных физико-географических условиях. Станция Уанкайо расположена в тропических широтах на западном побережье Южной Америки на высоте 50 м над уровнем моря. В субтропических широтах, на юго-востоке материка, находится Буэнос-Айрес. На Фолклендских островах, около южной оконечности материка, в умеренных широтах располагается Порт-Стенли.

Часовые суммы суммарной солнечной радиации, наблюдавшиеся на ст. Уанкайо, по абсолютной величине значительно выше,

чем на станциях Буэнос-Айрес и Порт-Стенли. Причиной это являются значительная высота места наблюдения над уровнем моря, большая полуденная высота солнца, малое изменение продолжительности дня в течение года, высокая прозрачность атмосферы. Изоплеты вытянуты по вертикальной оси графика и только в околополуденные часы образуют замкнутую область. С восходом солнца наблюдается медленное возрастание солнечного тепла и к полудню часовые суммы суммарной солнечной радиации могут

Рис. 1. Изоплеты суточного и годового хода суммарной солнечной радиации.

а — Уанкайо (12°07' ю. ш., 75°23' з. д.), *б* — Буэнос-Айрес (34°35' ю. ш., 58°29' з. д.), *в* — Порт-Стенли (51°42' ю. ш., 57°52' з. д.).

ри условии безоблачного неба) достигать предела возможных — 95 кал/(см²·ч).

С увеличением широты уменьшаются абсолютные значения часовых сумм суммарной радиации. На ст. Буэнос-Айрес (рис. 1 *б*) она субтропиков) становятся заметными различия этих характеристик в годовом ходе. В зимние месяцы максимальные полуденные высоты солнца составляют половину тех, которые наблюдают летом. Указанные различия достаточно четко проявляются в характере годового и суточного хода солнечной радиации. Летом часовые суммы суммарной радиации составляют 70 кал/(см²·ч), зимой — около 30 кал/(см²·ч). Максимальные часовые суммы в летние месяцы в полдень достигают 75 кал/(см²·ч), в часы около восхода и захода солнца потоки тепла незначительны.

В отличие от распределения суммарной радиации в Уанкайо Буэнос-Айресе, характерной особенностью режима солнечной

радиации в океаническом районе умеренной зоны (Порт-Стенн) является еще больший контраст в поступлении суммарной солнечной радиации зимой и летом. Последнее объясняется наличием больших годовых амплитуд полуденной высоты солнца и продолжительности дня. Этот район отличается облачной и часто пасмурной погодой. В летнее время максимальные часовые величины суммарной радиации лишь немного превышают $50 \text{ кал}/(\text{см}^2 \cdot \text{ч})$ мой, в полдень они составляют $10\text{--}20 \text{ кал}/(\text{см}^2 \cdot \text{ч})$.

Рис. 2. Годовой ход средних месячных значений суммарной солнечной радиации.

1 — Каракас ($10^{\circ}28'$ с. ш., $66^{\circ}58'$ з. д.), 2 — Порховьехо ($01^{\circ}04'$ ю. ш., $80^{\circ}26'$ з. д.), 3 — Буэнос-Айрес ($34^{\circ}35'$ ю. ш., $58^{\circ}29'$ з. д.), 4 — Порт-Стенн ($51^{\circ}42'$ ю. ш., $57^{\circ}52'$ з. д.).

На рис. 2 представлен годовой ход суммарной радиации для различных климатических областей Южной Америки. Выделяются два характерные кривые годового хода средних месячных значений суммарной радиации. Особенностью распределения на экваториальных станциях (Порховьехо, Каракас) является небольшая годовая амплитуда и наличие двух максимумов и двух минимумов

Таблица 1

Повторяемость (%) суточных значений суммарной солнечной радиации
(кал/см²·сут)

Станция	0—120	121—240	241—360	361—480	481—600	601—720
М а р т						
несуэла:						
Каракас			5	23	54	18
Матурин			5	51	44	
Мерида		1	2	19	67	11
Сьюдад-Боливар			4	40	56	
Санта-Елена		1	26	61	12	
куадор:						
Портовьехо		11	51	35	3	
Пичилинке	1	5	57	36	1	
Пуйо	8	50	34	8		
И ю н ь						
несуэла:						
Каракас		1	22	48	25	4
Матурин		9	24	55	12	
Мерида		2	13	46	34	5
Сьюдад-Боливар		3	22	63	12	
Санта-Елена		4	34	61	1	
куадор:						
Портовьехо	2	42	43	13		
Пичилинке	2	49	41	8		
Пуйо	6	22	51	19	2	
С е н т я б р ь						
несуэла:						
Каракас			9	53	36	2
Матурин		3	20	56	21	
Мерида			6	35	45	14
Сьюдад-Боливар			10	54	36	
Санта-Елена		1	8	74	17	
куадор:						
Портовьехо		22	26	47	5	
Пичилинке		38	47	15		
Пуйо	3	30	47	17	3	

Станция	0—120	121—240	241—360	361—480	481—600	601—720
Декабрь						
Венесуэла:						
Каракас		7	42	43	8	
Матурин		4	27	62	7	
Мерида		1	12	36	51	
Сьюдад-Боливар			35	64	1	
Санта-Елена		1	53	46		
Эквадор:						
Портовьехо	2	22	48	28		
Пичилинке	2	35	46	17		
Пуйо	1	43	49	7		

Максимумы приурочены к периодам весеннего и осеннего равенства. Однако в зависимости от годового хода облачности эти максимумы могут несколько смещаться. Так, в районе Каракаса второй максимум отмечается в августе, что вызвано особенностями циркуляции воздушных масс на данной территории в этот период. Южная окраина субтропической области высокого давления захватывает крайний север материка Южной Америки; нисходящие потоки, господствующие в антициклоне, не способствуют образованию облачности. Естественно, в этот период создаются наиболее благоприятные условия для поступления солнечного тепла. Месячные суммы суммарной радиации достигают более 15 ккал/(см²·мес).

В Буэнос-Айресе и Порт-Стенли, расположенных во внетропических широтах, отчетливо выражен годовой ход с одним максимумом и одним минимумом. Средние месячные суммы колеблются от 2 ккал/(см²·мес) в июне до 18 ккал/(см²·мес) в декабре.

Наряду с анализом средних суточных значений представляется интерес также рассмотрение повторяемости суточных сумм солнечной радиации определенных градаций. Для станций Венесуэлы и Эквадора была произведена выборка по градациям этих данных для четырех месяцев (март, июнь, сентябрь, декабрь). Ввиду не продолжительности рядов наблюдений (1964—1970 гг.) были выбраны значительные интервалы градаций (через 120 кал/(см²·сут)). Полученные результаты представлены в табл. 1, из которой видно, что наибольший процент повторяемости в июне и декабре приходится на суммы суммарной радиации 241—480 кал/(см²·сут) в марте и сентябре — 361—600 кал/(см²·сут). В 2—18% случаев в марте и сентябре суммарная радиация достигает 600—720 кал/(см²·сут).

Расположение станций в разнообразных климатических условиях обуславливает особенности распределения повторяемостей. На ст. Мерида (высота над уровнем моря 1480 м), в отличие от дру-

х приведенных в табл. 1 станций Венесуэлы, наибольшая повторяемость 67% в марте и 51% в декабре приходится на более высокую градацию — 481—600 кал/(см²·сут).

Рис. 3. Номограмма для расчета суточных сумм суммарной солнечной радиации.

Станции Эквадора, расположенные в низких широтах в юго-западной части Южной Америки, имеют предел колебаний суточных сумм 121—480 кал/(см²·сут), причем на суточные суммы менее 120 кал/(см²·сут) приходится менее 10% повторяемости. Большие суммы тепла (до 600 кал/(см²·сут)) могут быть в сентябре марте, их повторяемость 1—5%.

Для удобства использования актинометрической информации а практике построена номограмма суммарной солнечной радиации рис. 3), которая позволяет быстро получить подробную характеристику распределения исследуемого элемента. Учитывая, что суммарная радиация мало изменяется в течение года в экваториальных широтах, оказалось возможным ограничиться одной номограммой. При ее построении были использованы ежедневные и средние месячные значения суммарной солнечной радиации за 12 месяцев по станциям Венесуэлы (Каракас, Матурин, Мерида, Сьюдад-Болivar) и Эквадора (Портовьехо, Пичилинке, Пуйо). Зная многолетнее среднее суточное значение суммарной радиации за интересующий месяц, легко определить пределы ее колебания в отдельные дни с различной степенью обеспеченности. Номограмма позволяет получить характеристики обеспеченностей для всех пунктов, расположенных в экваториальной зоне. С помощью номограм-

Рис. 4. График комплексов суммарной солнечной радиации и облачности. Исобамба (00°82' ю. ш., 78°33' з. д.). Июнь.

1 — 10% и более, 2 — 5% и более, 3 — менее 5%.

и могут быть получены и такие расчетные характеристики, как среднее квадратическое отклонение σ_Q , асимметрия и эксцесс. Величина σ_Q равняется $1/2$ абсциссы, лежащей между обеспеченностями 16 и 84%. Так, для ст. Мерида среднее месячное значение суммарной солнечной радиации $\bar{Q}$ в июне составляет 450 кал/(см²·сут). Для $\bar{Q}$ для ст. Мерида, можно, как показано на номограмме (рис. 3), получить, что для обеспеченности 16% суммарная солнечная радиация равняется 550 кал/(см²·сут), для обеспеченности 84% — 344 кал/(см²·сут). Отсюда легко произвести дальнейшие расчеты: среднее квадратическое отклонение — 103 кал/(см²·сут), коэффициент изменчивости — 0,45.

Оценка погрешностей определения сумм суммарной радиации, как показано в работах А. Н. Лебедева [4, 5, 6], при применении метода номографирования не превышает 5% и лежит в пределах погрешности измерения величины.

На рис. 4 представлен график связи суммарной солнечной радиации и средней месячной облачности по ст. Исобамба для июня. При его построении были использованы ежедневные данные за период 1963—1969 гг. По горизонтальной оси вверху приведены значения суммарной солнечной радиации, внизу — обеспеченность сумм, по вертикали слева — облачность по восьмибалльной системе и справа — ее обеспеченность; цифры в поле координат называют различную повторяемость: более 10%, более или менее 10%. Данные рис. 4 показывают, в каких пределах изменяется суммарная солнечная радиация при определенных градациях облачности. Наибольшая повторяемость приходится на облачность выше 6 баллов, суммарная радиация при этом составляет 100—200 кал/(см²·сут) и лишь при количестве облаков менее 3 баллов она достигает 500 кал/(см²·сут). В интервале обеспеченности 40—84% количество облаков изменяется от 5 до 8 баллов. Малые значения суточной суммарной радиации более изменчивы, чем большие значения. При обеспеченности выше 95% суммарная радиация варьирует от 450 до 500 кал/(см²·сут).

Приведенные в работе сведения о режиме суммарной солнечной радиации в ряде районов территории Южной Америки свидетельствуют о наличии больших энергетических ресурсов на рассматриваемом континенте, которые могут быть использованы в технических целях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берлянд Т. Г. Распределение солнечной радиации на континентах. Л., Гидрометеоздат, 1961. 228 с.
2. Берлянд Т. Г. Суточный ход солнечной радиации в основных климатических зонах земного шара. — «Тр. ГГО», 1965, вып. 179, с. 3—27.
3. Будыко М. И. Климат и жизнь. Л., Гидрометеоздат, 1971. 472 с.
4. Климаты Зарубежной Азии. Под ред. А. Н. Лебедева, И. Д. Копанева. Л., Гидрометеоздат, 1975. 448 с.

5. Лебедев А. Н. Обеспеченность суточных величин суммарной солнечной радиации на островах Индонезии и Океании.— «Тр. ГГО», 1969, вып. 2 с. 59—63.

6. Параметры тропического климата. Под ред. А. Н. Лебедева. Л., Гидрометеоздат, 1973. 514 с.

7. Ходакова В. П. Некоторые закономерности распределения суточных величин суммарной солнечной радиации в субтропической зоне северного полушария.— «Тр. ГГО», 1968, вып. 232, с. 45—52.

В. П. ХОДАКОВА

ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ИНДОКИТАЕ

Чем более развито общество, тем лучше оно знает особенности климата, тем эффективнее использует его благоприятные стороны и избегает пути к преодолению или ослаблению неблагоприятных факторов. Трудно назвать какую-либо отрасль хозяйственной деятельности человека, которая могла бы нормально функционировать и развиваться без учета температурных факторов. Так, при создании новых видов материалов и изделий из них необходимы сведения о температуре воздуха, при которой допустима их эксплуатация. Сведения о температурном режиме вызывают большой интерес специалистов всех отраслей народного хозяйства. Для решения научно-технических задач, кроме среднего температурного режима, часто требуются данные об экстремальных значениях температуры в различных типах климата. Максимальные и минимальные температуры воздуха являются весьма изменчивыми характеристиками. Их абсолютные значения находятся в тесной зависимости как от метеорологических чисто погодных процессов, так и от многих физико-географических факторов, вида подстилающей поверхности, воздействия окружающих океанов, морей и внутренних водоемов. Большие контрасты в рельефе и физических свойствах подстилающей поверхности служат причиной местной циркуляции атмосферы, которая также имеет определенное значение в формировании экстремальных значений температуры. Одни формы местной циркуляции способствуют повышению температуры, другие, наоборот, к ее понижению.

В данной статье рассмотрены некоторые черты термического режима стран Лаоса, Вьетнама и Камбоджи. Список используемых источников дан в табл. 1.

Большая вытянутость территории в меридиональном направлении, преобладание горного рельефа, изрезанного долинами рек и глубокими ущельями, неоднородность подстилающей поверхности

существенно влияют на климатические условия территории, которые отличаются большим разнообразием.

По общему характеру климата страны Индокитайского полуострова располагаются в зоне тропических муссонов. В летнее время (с мая по сентябрь) вся территория Индокитая находится под воздействием экваториальных муссонов, которые приносят с юга запада влажные и теплые массы экваториального воздуха, а вместе

Т а б л и ц а

Станция	Координаты		Высота, м	Период наблюдений
	широта	долгота		
Лаокай	22°30' С	103°57' В	93	1907—35
Монгкай	21 31	107 51	9	1907—35
Ханой	21 02	105 50	17	1907—35
Хайфон	20 48	106 38	115	1909—31, 48—52
Луангпхабанг	19 53	102 08	304	1922—61
Далат	18 40	108 23	962	1949—53
Винь	18 40	105 40	6	1907—35
Вьентьян	17 57	102 34	170	1922—64
Саваннакхет	16 40	105 00	184	1928—61
Хюэ	16 29	107 34	7	1907—08, 40—44
				1947—52
Туран	16 02	108 11	6	1931—35
Паксе	15 07	105 47	92	1930—63
Стунгренг	13 31	105 58	54	1929—52
Сиенреап	13 22	103 51	15	1929—34, 36—44,
				1947, 49, 52
Баттамбанг	13 16	103 12	18	1928—35
Кампонгтям	12 18	104 40	10	1907—35
Ньячанг	12 15	109 12	4	1907—44, 47—52
Пномпень	11 33	104 51	10	1907—...52
Хо Ши Мин	10 49	106 42	9	1907—...52
Кампот	10 37	104 13	1	1930—35
Сен-Жак, мыс	10 20	107 05	171	1908—51

с ними обильные осадки. Для сезона дождей характерны устойчивые относительно высокие температуры. Высокие температуры и высокая относительная влажность создают агрессивную среду сильно влияющую на технику, материалы и даже на самого человека.

В ноябре на юго-востоке Азии заканчивается процесс переход от экваториальных муссонов к северо-восточному муссону и наступ

ет зимний сухой сезон года, который продолжается до марта. Холодный континентальный воздух, поступающий в это время года в умеренных широт, по мере продвижения на юг постепенно прогревается. Проникновению холодных масс воздуха с севера в Центральную и западную части Индокитая препятствуют горные цепи Центральной Азии. Таким образом, северо-восточный муссон приносит прогретые и умеренно увлажненные воздушные массы. По сравнению с воздухом экваториальных муссонов они отличаются сухостью и относительно низкими температурами.

В табл. 2 и 3 приводятся значения абсолютного максимума и минимума температуры. Они представляют собой редко встречающееся явление. Частота появления их определяется длиной использованного периода наблюдений. Естественно, не исключена возможность, что в будущем могут встретиться еще более высокие и низкие значения, однако последние не могут быть существенно выше или ниже тех, которые наблюдались раньше.

По этим значениям температуры можно судить о том, до каких крайних пределов может повышаться или понижаться температура данной местности. Данные табл. 2 говорят о возможном высоком температурном режиме района Индокитая и о его устойчивости из года в год. На всех станциях Индокитая возможны температуры выше 40°C , их значения несколько понижаются только в зимние месяцы (декабрь — январь). На преобладающей территории Индокитая самым теплым месяцем является апрель и лишь в ряде северных районов — май, (Хайфон, Ханой, Монгкай, Лаокай).

По данным табл. 3 видно, что абсолютные минимальные температуры испытывают значительные колебания. Характерными являются и резкие падения температуры в направлении с севера на юг. Наряду с этим следует отметить, что в отдельные годы на территории Индокитая все же возможны небольшие затоки холодного воздуха, которые обуславливают понижение температуры до $1-3^{\circ}\text{C}$. На северных станциях возможные абсолютные минимальные температуры в зимний период около 2°C , на юге — $15-17^{\circ}\text{C}$.

В течение летних месяцев уровень минимальных температур однороден на всей территории Индокитая. Они изменяются от 20°C до 15°C .

Амплитуда колебаний экстремальных температур составляет $15-20^{\circ}\text{C}$, для зимних месяцев на северных станциях она может достигать 30°C . Однако следует помнить, что значения абсолютных максимумов и минимумов температуры в реальной действительности могут быть несколько выше или ниже приведенных в данной работе. И маловероятно, чтобы в одном и том же году отмечался абсолютный максимум и абсолютный минимум. Так, на ст. Хо Ши Мин абсолютный минимум $13,8^{\circ}\text{C}$ наблюдался в январе 1937 г., абсолютный максимум $40,0^{\circ}\text{C}$ наблюдался в апреле 1912 г. Значения абсолютных температур определяются длиной исследуемых периодов наблюдений, указанных в табл. 1.

Таким образом, изменчивость абсолютных максимумов лишней не подчеркнет, насколько велика устойчивость термических

Таблица 2

Абсолютная максимальная температура воздуха (°С)

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Лаокай	31,1	34,0	37,0	39,0	42,8	39,3	39,7	38,3	37,2	35,9	34,8	32,8
Монгкай	28,0	29,9	34,8	33,8	37,5	37,0	39,1	37,8	39,0	36,4	33,2	30,9
Ханой	33,1	34,4	36,7	39,4	42,8	40,0	40,0	38,3	37,3	35,6	36,1	36,7
Хайфон	30,3	34,0	34,8	34,7	41,5	39,0	38,0	37,5	37,0	36,5	33,1	28,8
Луангпхабанг	39,2	39,1	41,0	44,8	44,8	44,0	39,4	39,8	38,0	38,6	36,3	33,0
Далат	28,0	30,5	31,8	32,1	31,0	30,2	30,5	30,0	30,2	30,2	29,7	28,3
Винь	34,9	35,5	39,1	39,6	41,1	42,6	41,1	39,5	39,4	37,0	36,1	31,6
Вьентьян	34,9	37,2	39,8	39,7	38,9	37,0	36,0	36,6	35,2	34,5	34,4	34,8
Саваннакхет	38,5	39,0	42,0	41,5	40,5	36,4	36,2	35,5	35,4	36,5	35,3	36,0
Хюэ	34,6	36,2	38,3	40,0	39,5	39,9	39,8	39,2	38,2	35,5	35,4	32,2
Туран	34,5	36,8	36,3	40,4	39,0	40,0	40,6	39,0	36,7	34,9	31,8	30,8
Паксе	36,8	37,9	38,0	39,7	38,6	36,2	35,2	34,8	35,3	35,0	35,0	34,9
Струнгтрэнг	35,0	37,1	37,5	38,9	38,2	35,8	34,4	34,2	34,0	34,0	33,9	34,0
Сиемреап	35,0	36,8	37,9	39,2	38,2	38,7	35,7	35,2	34,7	33,7	34,2	34,2
Баттамбанг	35,0	37,3	38,5	39,8	39,0	37,9	35,3	34,9	33,8	33,1	33,4	33,5
Ньячанг	31,9	33,3	34,2	35,9	38,5	39,5	39,0	39,2	38,3	34,8	34,3	32,8
Кампонгчям	35,8	37,6	39,1	39,3	37,5	35,6	35,6	35,2	34,2	34,2	34,1	34,5
Пномпень	36,3	36,7	39,0	40,5	38,5	38,4	36,6	36,0	35,5	34,4	34,4	34,8
Хо Ши Мин	36,4	38,7	39,4	40,0	39,0	37,5	34,6	34,9	35,3	34,6	35,0	36,3
Кампот	35,1	34,5	37,2	35,5	35,4	36,1	33,9	35,5	34,1	33,5	33,7	33,6

Абсолютная минимальная температура воздуха (°С)

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Лаокай	2,2	7,2	6,8	10,0	14,8	18,0	21,4	20,7	15,8	10,7	8,0	3,6
Монгкай	2,1	4,8	6,8	10,0	14,6	18,8	19,9	21,2	16,4	10,8	3,0	4,1
Ханой	5,6	6,1	11,5	10,0	15,6	20,5	21,7	21,1	17,2	13,9	6,7	6,7
Хайфон	6,7	7,4	9,5	11,2	16,8	21,5	22,0	21,9	17,3	12,8	8,0	8,0
Луангпхабанг	0,8	7,9	9,8	13,2	17,0	14,0	19,2	14,0	10,8	11,8	6,0	4,3
Далат	7,6	9,7	9,5	12,8	14,4	16,0	15,0	14,8	14,3	14,0	10,5	8,0
Винь	4,0	7,5	9,8	11,4	14,8	20,3	22,5	19,0	17,4	15,0	8,4	8,2
Вьентьян	3,1	7,6	12,1	13,8	19,1	21,1	21,2	21,1	19,8	12,9	10,3	4,9
Саваннакхет	5,3	8,7	10,5	11,3	19,7	19,7	19,6	20,8	18,0	12,0	8,5	5,7
Хюэ	8,8	11,0	12,0	14,1	17,7	20,9	19,8	21,0	19,1	15,9	12,9	11,5
Туран	11,0	14,3	15,2	16,7	21,8	22,3	21,8	21,2	20,0	17,4	14,8	13,3
Паксе	7,0	13,2	11,7	15,2	19,9	17,7	20,7	20,7	19,8	16,7	13,0	10,8
Стунгтрэнг	9,5	14,0	17,3	20,0	18,9	19,6	20,1	19,3	19,4	17,2	15,9	11,0
Сиемреап	11,2	14,9	16,0	18,0	19,0	18,0	20,0	19,5	20,0	17,4	15,0	13,3
Баггамбанг	10,6	14,4	16,1	21,0	22,0	21,7	21,2	22,1	21,9	20,2	13,4	10,7
Нячанг	14,6	14,6	16,4	19,4	19,7	19,8	20,6	21,5	21,3	18,8	16,9	15,3
Кампонгтам	13,0	16,9	18,2	21,1	21,6	21,8	21,1	21,6	21,0	19,4	16,1	13,7
Пномпень	14,0	15,2	19,0	20,0	20,6	21,2	20,1	22,0	22,0	20,8	18,0	14,4
Хо Ши Минн	13,8	16,2	17,5	20,0	21,1	20,4	19,4	20,0	20,8	19,8	17,6	13,9
Кампот	15,9	18,3	20,1	22,4	22,3	21,4	21,8	21,6	21,8	21,7	18,9	15,1
Сен-Жак, мыс	16,6	18,0	19,5	19,7	19,6	18,4	17,5	19,2	20,5	18,7	17,0	15,0

ресурсов Индокитая. Поэтому при практических расчетах нет необходимости допускать какие-то необычные условия, которые раньше не были учтены в наблюдениях метеорологических станций.

Очевидно, что при проектировании зданий, выпуске промышленной продукции, конструировании двигателей, промышленных установок, приборов и прочего следует обратить внимание на экстремальные значения температуры воздуха.

Исследование термического режима показывает, что между средними из абсолютных максимумов и минимумов и самими абсолютными максимумами и минимумами существует определенная взаимосвязь. Об изменчивости годовых предельных значений температуры можно судить по номограмме (рис. 1 и 2). Она построена на основании максимальных и минимальных ежемесячных температур по материалам наблюдений за отдельные годы. По осям абсцисс нанесены возможные предельные значения, встречающиеся в отдельные годы, а по оси ординат — средние из этих значений за длительный обработанный период наблюдений. В поле координат даны линии равных значений абсолютных максимумов 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90%-ной обеспеченности. Ширина номограммы (расстояние между точками, лежащими на линиях 10 и 90%-ной обеспеченности) позволяет судить об изменчивости описываемой характеристики. В пределах между крайними линиями номограммы абсолютный максимум и минимум бывает в 90% всех лет наблюдений. Значения, находящиеся за пределами крайних линий номограммы встречаются в 10% случаев. Следовательно, с помощью номограммы можно оценить обеспеченность и величину наиболее частых и наиболее редко наблюдающихся абсолютных значений.

Номограмма на рис. 1 построена для наименьших температур января, на рис. 2 — для максимальных температур апреля. Средние минимальные температуры (рис. 1) варьируют в интервале от 5 до 20°C. В природных условиях в отдельные годы минимальные температуры отмечались от 0 до 24°C. Для января общий размах в колебаниях средних составляет около 15°C, а в колебаниях за отдельные годы — около 24°C. По номограмме (рис. 1) при средней температуре 15°C в 95% лет минимум температуры бывает в пределах выше 10°C, в одни 5% лет они ниже 10°C, а в другие 5% лет выше 19°C. Следовательно, в 90% лет абсолютные минимумы варьируют от 10 до 19°C. С помощью номограммы подобным способом могут быть рассчитаны минимальные температуры любой заданной обеспеченности.

Максимальные температуры для Индокитая представлены на номограмме (рис. 2). В апреле средние значения абсолютного максимума всюду выше 30°C. Колебания в средних составляют около 10°C, а изменения абсолютного максимума в отдельные годы — около 20°C. При средней максимальной температуре 30°C в одни 50% лет максимум может колебаться от 24 до 30°C, а в другие 50% — от 30 до 36°C.

Крайние значения, вычисленные по номограмме, могут отличаться от наблюдаемых величин на 3—4°C, в отдельных случаях и

Рис. 1. Номограмма для расчета абсолютного минимума температуры воздуха различной обеспеченности. Январь.

Рис. 2. Номограмма для расчета абсолютного максимума температуры воздуха различной обеспеченности. Апрель.

5°C. Это объясняется тем, что линии наиболее низких и наиболее высоких значений температур определены по внешним краевым данным пунктов, имеющих большую изменчивость. С помощью приведенных номограмм можно определить не только пределы возможных изменений температуры, но и получить полный спектр рассматриваемых параметров. С помощью этих номограмм можно вычислять абсолютные максимальные и минимальные температуры воздуха различной обеспеченности для всех районов Индокитая.

Рис. 3. Годовой ход средней продолжительности непрерывного периода с температурой выше 30°C.

1 — Ханой, 2 — Сайгон.

В настоящее время в ускоренном испытании новых технических материалов, при моделировании климата крайне необходимы знания о продолжительности атмосферных явлений, в частности о температуре воздуха.

В данной статье ввиду отсутствия большого количества ежечасных наблюдений анализируется непрерывная продолжительность (в часах) температуры выше 30°C для ряда станций Индокитая. На рис. приведен годовой ход средней продолжительности непрерывных периодов с температурой выше 30°C для станций Хан

и Хо Ши Мин. В Ханое высокие температуры устанавливаются в период с апреля по октябрь, на ст. Хо Ши Мин, расположенной в юге Индокитая, температуры выше 30°C отмечаются в течение всего года.

Сама по себе средняя величина недостаточна для характеристики непрерывной продолжительности высоких температур. Представляет интерес и повторяемость периодов различной длительности. Она вычислена для периодов с температурой выше 30°C длительностью более 1 ч, 2 ч и так далее до 19 ч (табл. 4).

Повторяемость периодов различной длительности определяется как чисто географическими факторами, так и местными орографическими. Наибольшая повторяемость температуры выше 30°C может продолжаться не более 10 ч подряд, повторяемость большей длительности незначительна.

Для ст. Хо Ши Мин непрерывная температура выше 30°C чаще всего (в 62% случаев) удерживается в течение 4—7 ч, для района Ханоя — в течение 19 ч, т. е. почти сутки.

Таким образом, полученные данные дают представление как о пространственно-временном распределении, так и о продолжительности периодов высоких температур. По номограммам можно получить экстремальные температуры для района Индокитая с достаточной для практики точностью.

Таблица 4

вторяемость периода с температурой выше 30°C (в процентах от общего числа случаев) за период 1963—1964 гг.

Ганция	Продолжительность, ч									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ой	5	5	8	6	9	8	9	11	8	6
фон	4	4	7	7	4	9	7	14	9	9
ь	6	5	5	7	6	10	15	9	10	6
Ши Мин	4	8	10	16	14	16	16	8	6	2

Ганция	Продолжительность, ч									Число периодов
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ой	13	4	2	2	1	1	1	—	1	245
фон	6	4	4	2	2	1	1	4	2	261
ь	5	4	3	4	1	1	1	—	2	240
Ши Мин	—	—	—	—	—	—	—	—	—	597

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Климат Лаоса. Климатический справочник. Вьентьян, Лаос, 1967. 119 с.
2. Annales de services météorologiques de la France d'Ouivre Mer., vol. 2, 1—1959. Paris, 1955—1968.
3. Nguét san Khitu'ong 1963—1967. Viêt Nam. Dân Chủ Công Hoa, 63—1967.

А. Н. ЛЕБЕДЕВ, Е. М. АНДРЕЕВ

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСЯЧНЫХ И ГОДОВЫХ СУММ ОСАДКОВ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ РЯДА НАБЛЮДЕНИЙ

При исследовании климата всегда возникает вопрос о надежности полученных результатов. Это касается средних многолетних значений, средних квадратических отклонений σ , коэффициента вариации c_v , вероятностных показателей и многих других параметров метеорологических элементов и их комплексов.

Долгое время в климатологии придерживались мнения, что чем длиннее ряд наблюдений, тем точнее среднее значение, полученное по нему. Всюду упоминалось о том, что средние многолетние значения необходимо приводить к одному общему длинному периоду или вообще по возможности к длинному ряду. Что же, в этом было определенное значение, особенно на заре развития самой науки. И в наше время в программах вузов, кандидатских минимумов и в старых учебных пособиях все еще встречаются напоминания о важности и необходимости приведения коротких рядов к длинным.

Согласимся с тем, что если речь идет о климатологических исследованиях, то, конечно, следует оперировать данными по возможности за большой период наблюдений. Такие данные, как ни представляется, прежде всего необходимы для расчета вероятностных характеристик. В данном случае большие выборки сильно облегчают вопрос формулировки выводов для целей практики. Неоспоримо и для получения различных средних значений удобно иметь тоже длинные ряды. Но здесь должен присутствовать и здравый научный рассудок. Нужно всегда исходить из того, что дает бесконечное удлинение рядов наблюдений, оправдано ли это научными и практическими соображениями.

Все вопросы, связанные с точностью и достоверностью расчета климатических данных, особенно важны при изучении климата зарубежных территорий по крупным физико-географическим зонам, тем более по материкам земного шара. Каждый исследов

, занимающийся обобщением метеорологической информации, это, насколько трудно получить необходимые материалы непрерывных наблюдений по станциям с длинными рядами. Причин много и вряд ли следует на них останавливаться. Ясно одно, что нередко приходится довольствоваться разрозненными данными. Мы не говорим о том, что форма публикаций и сроки наблюдений в разных странах разные. А ведь климат, если так можно выразиться на месте не стоит, он находится в постоянном движении, со всеми присущими ему законами колебания и изменения.

Чтобы в какой-то мере выяснить некоторые из поставленных вопросов по климатам Южной Америки, мы сочли возможным специально рассмотреть условия распределения месячных и годовых

Таблица 1

Число выборок по 10, 20, 30 и 40-летним периодам наблюдений

Станция	Время	Периоды				Всего
		10	20	30	40	
Вальпараисо	Июль	69	59	49	39	216
Вальпараисо	Год	68	58	48	38	212
Манаус	Январь	47	37	27	17	128
Манаус	Июль	47	37	27	17	128
Манаус	Год	44	34	24	10	116
Итого		275	225	175	125	800

количество осадков в тропической и экваториальной зонах. Для этой цели воспользовались данными Вальпараисо (Чили) с 1869 по 1963 г. и Манауса (Бразилия) с 1902 г. по 1960 г. Эти метеорологические станции находятся в разных физико-географических областях, однако по климатическим данным они являются наиболее представительными для большей части материка.

Расчеты произведены с помощью ЭВМ по программе, составленной Е. М. Андреевой. Они строились на основе метода номограмм. Для июля и года по ст. Вальпараисо и для января, июля и года по ст. Манаус были вычислены все возможные средние $\bar{x}$, средние квадратические отклонения σ и коэффициенты вариации c_v для 10, 20, 30 и 40-летних рядов наблюдений. Общее число выборок для этих периодов приведено в табл. 1.

Такое число выборок можно было сделать только при помощи быстродействующих машин. Среди них наиболее многочисленные 10-летние периоды (275). Сравнительно много и 40-летних периодов (125). Полученные результаты позволили проанализировать изменения параметров $\bar{x}$, σ и c_v в зависимости от длины периодов изменчивости элемента. Одновременно они позволили рассмотреть и общую тенденцию изменения этих параметров на фоне

Рис. 1. Кривые распределения скользящих средних 10, 20, 30 и 40-летних июльских сумм осадков в доверительных границах 68, 90 и 95%-ной обеспеченности. Вальпараисо (Чили), 1869—1963 гг.

1 — 10 лет, 2 — 20 лет, 3 — 30 лет, 4 — 40 лет.

полувекового режима увлажнения. Кривые хода средних месячных и годовых сумм осадков, вычисленных по 10, 20, 30, 40-летним данным, представлены на рис. 1—5. Прямыми линиями (сплошными и пунктирными) показаны пределы доверительных границ.

Расчеты для января по Вальпараису не производились, поскольку в это время здесь осадки не выпадают, они носят лишь случайный характер. Результаты расчетов для июля приведены в табл. В ней для каждого избранного ряда даются характеристики для двух выборок, отражающих условия аномально влажных периодов: для одного периода, имеющего среднюю около нормы (вычисленную по данным всего ряда), и для двух выборок, отражающих условия аномально сухих периодов. По такому принципу даются данные для 10, 20, 30 и 40-летних рядов наблюдений. Весь объем произведенных вычислений использован при построении кривых средних сумм осадков, приведенных на рисунках.

рис. 2. Кривые распределения скользящих средних 10, 20, 30 и 40-летних годовых сумм осадков в доверительных границах 68, 90 и 95%-ной обеспеченности. Вальпараисо (Чили), 1869—1963 гг.

Усл. обозн. см. рис. 1.

В Вальпараисо июль является самым дождливым месяцем в году. По имеющимся данным месячная норма осадков составляет 95 мм. При этой норме в 1900 г. выпало 415 мм, а в 1950 г. — 0 мм. Диапазон вариации месячных сумм осадков очень велик. Минимум 1950 г. указывает на то, что самый дождливый месяц здесь может быть иногда и типичным бездождным периодом, ведь 0 мм осадков за месяц в тропическом сухом климате это все равно, что 0 мм. Средние месячные суммы осадков июля варьируются от 53 до 194 мм по 10-летиям, от 60 до 138 мм по 20-летиям, от 76 до

Рис. 3. Кривые распределения скользящих средних 10, 20, 30 и 40-летних январских сумм осадков в доверительных границах 68, 90 и 95%-ной обеспеченности. Манаус (Бразилия), 1902—1959 гг.

Усл. обозн. см. рис. 1.

118 мм по 30-летиям, от 83 до 115 мм по 40-летиям. Пределы колебаний средних месячных значений всюду значительны. Даже в 40-летних средних значениях возможны отклонения от нормы (средней, вычисленной по 59-летнему ряду) на 20%, в 30-летних значениях на 25%, в 20-летних значениях на 40% и в 10-летних значениях на 100%. При небольших выборках (10—20 лет) существенно раз-

Рис. 4. Кривые распределения скользящих средних 10, 20, 30 и 40-летних июльских сумм осадков в доверительных границах 68, 90 и 95%-ной обеспеченности. Манаус (Бразилия), 1902—1960 гг.

Усл. обозн. см. рис. 1.

чными могут быть и максимальные суммы осадков за период. Они могут оказаться на 200—300 мм меньше максимума основного ряда. А вот в минимумах ошибки не будет. Во всех случаях 10-летние и 20-летние ряды содержат такие данные, которые близки или равны главному минимуму.

При использовании 10 и 20-летних рядов весьма существенное различие наблюдается в суммах осадков по всем градациям обеспеченности, вплоть до 80%. Только значения 90 и 95%-ной обеспеченности получаются более или менее сопоставимыми, поскольку они малы и для сухого тропического климата не важно, выпали адки в количестве 3 или 11 мм. С увеличением рядов до 30—40 лет сходные результаты получаются уже при 40—50%-ной обеспеченности. Здесь существенные расхождения могут быть только при редко встречающихся крупных суммах осадков — больше 130—170 мм.

В соответствии с изменением средних месячных значений по бранным периодам колеблются средние квадратические отклоне-

Рис. 5. Кривые распределения скользящих средних 10, 20, 30 и 40-летних годовых сумм осадков в доверительных границах 68, 90 и 95%-ной обеспеченности. Манаус (Бразилия), 1902—1958 гг.

Усл. обозн. см. рис. 1.

я σ и коэффициенты вариации c_v . Но выявилась и одна особенность, которая показывает, что в наиболее сухие периоды c_v меньше, чем в наиболее влажные. Это характерно для всех рядов независимо от их длины, но наиболее резко проявляется в данных 10 и 20 лет. Небольшой изменчивостью выделяются такие 10- и 20-летние ряды, в которых максимумы не так велики (150—200 мм).

Годовая норма осадков в Вальпараисо, вычисленная по данным 10-летнего ряда наблюдений, составляет 449 мм. Истинные же величины варьируют от 62 мм в 1924 г. до 1247 мм в 1914 г. Таким образом, самый дождливый год приносит осадков в три раза больше нормы, а сухой год — в семь раз меньше нормы. Засушливость опического климата весьма резко выступает и в годовых суммах осадков. Средние годовые значения по 10-летним рядам колеблются от 335 до 626 мм, а по 20-летним рядам — от 346 до 533 мм. Годовые максимумы варьируют соответственно от 489 до 1040 мм и от 604 до 1247 мм (табл. 3).

Распределение годовых сумм осадков по градациям обеспеченности, как и месячных, в значительной мере определяется максимумом. При годовых максимумах осадков 604 и 1247 мм выравнивание вероятностных показателей происходит только при 95%-ной обеспеченности, а при максимумах около 800 и 1000 мм — при 10%-ной. Выравнивание значений по градациям обеспеченности годовых суммах еще зависит от минимальных значений, которые варьируют от 62 до 289 мм. Иное явление наблюдается в распределении месячных максимумов. Они всюду были очень малы.

В распределении годовых сумм осадков, особенно сумм осадков 10, 20 и 30%-ной обеспеченности, в отдельных случаях сохраняются значительные расхождения между данными, вычисленными по рядам одной и той же длительности. Даже в данных, вычисленных по 40-летним периодам, разности в суммах осадков 5—10%-ной обеспеченности могут составлять 340—350 мм, а разности в суммах осадков 20—30%-ной обеспеченности — 250—300 мм. Для засушливого тропического климата Чили с годовой нормой осадков 50 мм с такими расхождениями в данных нельзя не считаться. В осадках 50%-ной обеспеченности, вычисленных по разным 40-летним периодам, разность достигает 100 мм. Все эти данные показывают, что даже для расчета годовых сумм осадков необходимы достаточно большие ряды наблюдений. Если они невелики, необходимо знать хотя бы примерные размеры, в пределах которых могут колебаться данные, полученные по ним.

Манаус считается одним из характерных пунктов Амазонской изменности. Здесь осадки выпадают в течение года, но январь значительно дождливее июля. В среднем многолетнем в январе выпадает 265 мм, в июле 61 мм и за год 1990 мм. Это влажный жаркий экваториальный климат Амазонки. Но в многолетнем метеорологическом режиме возможны существенные колебания выпадении осадков. В самый засушливый январь выпадает 30 мм, в самый дождливый — 460 мм, в июле соответственно 1 и 270 мм,

Таблица 2

Июльские суммы осадков различной обеспеченности. Вальпараисо

Характер увлажнения	Средняя	Максимум	Обеспеченность, %												Минимум	σ	с _р
			5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95				
			По 10-летиям														
Влажно	174	415	—	383	326	278	228	154	77	48	33	9	—	8	139	0,80	
	194	415	—	384	308	274	248	220	140	88	52	9	—	8	125	0,64	
	94	345	—	300	188	96	58	36	23	14	11	8	—	8	118	1,26	
Около нормы	53	146	—	132	96	73	56	42	30	17	12	11	—	11	40	0,75	
	59	146	—	134	108	85	65	50	37	28	20	12	—	11	38	0,64	
По 20-летиям																	
Влажно	138	415	392	349	262	192	137	98	64	40	20	12	8	8	125	0,90	
	136	415	401	362	280	204	136	88	56	36	22	12	8	8	126	0,93	
	94	301	292	266	210	180	78	48	32	22	16	11	9	9	94	1,0	
Около нормы	64	182	168	144	112	89	70	54	39	26	16	8	4	3	48	0,75	
	64	182	168	144	112	89	70	54	39	26	16	8	4	3	48	0,75	

Влажно	118	415	354	303	235	168	115	73	42	27	19	12	8	8	116	0,98
	115	415	363	306	228	159	98	61	43	29	18	10	8	8	116	1,0
Около нормы	95	301	279	243	179	132	96	69	48	31	18	11	9	9	85	0,80
Сухо	76	279	219	160	116	94	76	61	47	34	22	12	5	3	66	0,87
	77	297	230	169	124	98	78	60	46	32	19	10	5	3	67	0,87

По 40-летиям

Влажно	115	415	352	290	200	146	111	88	57	35	19	10	8	8	105	0,91
	112	415	374	312	208	142	103	75	48	29	16	9	8	8	107	0,96
Около нормы	93	301	281	245	173	114	86	65	49	34	22	12	9	9	79	0,85
Сухо	84	279	232	190	140	108	82	54	47	35	24	13	7	3	67	0,80
	83	279	224	186	142	108	83	65	49	36	25	15	7	3	64	0,77
По всему ряду	95	415	292	242	152	116	90	66	47	32	18	10	7	3	97	0,02

Годовые суммы осадков различной обеспеченности. Вальпараксо

Характер увлажнения	Средняя	Максимум	Обеспеченность, %										Минимум	σ	с _р	
			5	10	20	30	40	50	60	70	80	90				95
			По 10-летним													
Влажно	626	1040	—	1020	910	840	770	620	460	370	310	250	—	220	284	0,45
	602	1040	—	1010	860	760	620	510	430	360	320	270	—	236	282	0,47
	448	796	—	750	590	490	430	390	370	360	330	300	—	289	147	0,33
Около нормы	340	604	—	520	420	370	340	320	310	280	240	200	—	195	110	0,32
	335	489	—	470	415	380	350	320	360	280	250	200	—	195	87	0,26
По 20-летним																
Влажно	533	1247	1200	1150	730	560	500	440	390	340	290	260	240	236	290	0,54
	541	1247	1220	1170	910	700	560	460	390	340	290	250	230	220	293	0,54
	452	879	820	680	520	470	440	420	400	380	350	280	180	62	174	0,39
Около нормы	339	604	580	520	430	390	360	330	290	260	230	210	200	195	106	0,31
	339	604	580	520	430	390	360	330	290	260	230	210	200	195	106	0,31

Влажно	536	1247	1160	1120	780	620	510	430	360	310	260	240	220	220	277	0,52
	536	1247	1100	960	760	620	540	490	440	380	310	210	100	62	279	0,52
Около нормы	441	879	790	700	590	520	470	420	380	340	300	200	130	62	179	0,40
Сухо	370	796	670	540	440	400	370	340	320	280	250	220	210	195	127	0,34
	376	796	700	570	460	420	380	360	320	310	280	230	210	195	127	0,34

По 40-летиям

Влажно	517	1247	1080	950	750	610	520	460	410	340	280	230	110	62	264	0,51
	524	1247	1080	940	750	650	560	480	440	350	280	180	120	62	260	0,50
Около нормы	441	943	810	730	610	520	470	430	390	350	280	190	110	62	181	0,41
Сухо	400	879	740	610	500	460	420	380	340	300	250	170	110	62	150	0,39
	399	879	760	620	480	430	410	400	360	320	270	180	110	62	184	0,39
По всему ряду	449	1247	910	780	560	480	430	400	360	310	270	220	200	62	231	0,51

Январские суммы осадков различной обеспеченности. Манаус

Характер увлажнения	Сред- няя	Макси- мум	Обеспеченность, %										Мини- мум	σ	с φ	
			5	10	20	30	40	50	60	70	80	90				95
			По 10-летиям													
Влажно	314	461	—	446	410	372	330	292	262	236	216	196	—	189	90	0,29
	310	461	—	430	380	340	305	276	254	234	214	196	—	189	90	0,29
	265	450	—	363	312	283	266	258	246	222	194	160	—	142	81	0,31
Около нормы	217	327	—	310	273	246	232	224	214	206	192	160	—	31	72	0,33
	210	327	—	314	272	244	226	214	204	190	157	74	—	31	75	0,36
По 20-летиям																
Влажно	299	461	448	426	384	347	316	286	258	234	210	178	160	150	85	0,28
	300	461	449	420	378	346	320	296	270	244	218	188	161	150	85	0,28
Около нормы	267	461	434	402	354	316	288	268	248	228	200	146	80	31	97	0,36
	235	450	404	334	268	252	240	228	218	206	186	142	94	31	83	0,35

Влажно	283	461	434	406	362	324	292	268	246	230	214	186	166	150	84	0,30
	284	461	440	418	376	340	304	274	248	224	204	182	164	150	85	0,30
Около нормы	205	461	438	400	344	300	268	246	234	220	202	153	88	31	89	0,34
Сухо	253	461	438	390	310	278	260	244	230	214	196	163	110	31	85	0,34
	259	461	418	360	300	272	254	242	220	218	198	170	140	31	84	0,32

По 40-летиям

Влажно	287	461	440	414	364	328	300	276	254	236	212	182	164	150	79	0,28
	286	461	444	420	370	330	296	270	250	232	214	190	166	150	80	0,28
Около нормы	264	461	428	396	348	312	282	254	234	216	192	154	115	31	88	0,33
Сухо	257	461	432	390	326	290	264	246	230	213	192	150	114	31	85	0,33
	259	461	414	370	314	286	264	247	232	220	208	140	80	31	84	0,32
По всему ряду	265	461	426	390	339	305	275	251	226	218	203	172	144	31	87	0,33

а за год — 1354 и 2712 мм. Нетрудно видеть, что и во влажно-экваториальном климате Манауса в распределении осадков возможны заметные колебания, но не столь большие, как, например в Вальпараисо (табл. 4).

Средние суммы осадков в январе колеблются от 210 до 314 мм по 10-летиям, от 235 до 300 мм по 20-летиям, от 253 до 284 по 30-летиям и от 257 до 287 по 40-летиям. Значит, даже средние многолетние значения, вычисленные по данным разных 30, 40-летних рядов, могут различаться на 10—12%. Но по отношению к норме, полученной по данным за 59 лет, эти расхождения будут наполовину меньше.

Если ориентироваться на норму и все расчеты строить на этой основе, то и средние по 10-летиям могут быть приемлемыми показателями режима увлажнения. Исключительно влажные 10-летия будут давать завышение средних значений на 40—50%, а исключительно засушливые — занижение на 40—50%. Но суммы осадков по грациям обеспеченностей показывают, что истинные месячные значения от года к году варьируют в широких пределах: в сухие десятилетия они изменяются от 31 до 327 мм, а во влажные — от 90 до 460 мм. Вероятность сумм осадков около нормы мала. Не этим признакам средние суммы осадков из 10-летних рядов не могут служить надежными характеристикам режима увлажнения.

Увеличение ряда до 20 лет уменьшает пределы колебания средних месячных значений. Их отклонения от нормы уже не превышают 25—35 мм, но вероятностные характеристики по-прежнему редко наблюдаются около среднего многолетнего значения. Это характерно не только для коротких (10 и 20-летних) рядов, но и для длинных (30 и 40-летних). Однако при 30 и 40-летних рядах наблюдений во влажные и сухие периоды сумма осадков по соответствующим грациям обеспеченности распределяется более согласованно, чем при 10 и 20-летних рядах. Это понятно, так как при больших выборках почти одинаково вероятно, что исключительно влажные и исключительно сухие годы, определяющие крайние условия режима увлажнения, войдут в окончательные расчеты. Это видно и на примере максимума и минимума 30 и 40-летних рядов.

По средним величинам для января Манауса достаточно иметь ряд в 20 лет, чтобы рассчитывать на получение надежной многолетней величины. Для расчета характеристик различной обеспеченности 20-летний ряд наблюдений недостаточен. При этом ряды месячные суммы осадков 30%-ной обеспеченности, вычисленные по разным 20-летиям, могут различаться на 100 мм, в то время как вычисленные по разным 30-летиям — только на 50 мм. Не касаясь других структурных особенностей в распределении осадков, можно сказать, что 20 лет мало для получения вероятностных показателей осадков января.

В табл. 5 приведены июльские суммы осадков и параметры их изменчивости. Этот месяц в Манаусе является сравнительно сухим

менем года. Как и следует из общих закономерностей климата, июльские суммы осадков более изменчивы, чем январские. Коэффициенты вариации достигают 0,70—0,90, и лишь в исключительно засушливые десятилетия они могут быть равны —0,57.

Не вдаваясь в некоторые особенности режима увлажнения года, а именно в минимум осадков в году, укажем, что выводы, которые и сделаны для января, вполне применимы для июля. Только июльские ряды и более в состоянии обеспечить получение достоянных средних и вероятностных данных. Они позволяют надеяться на получение устойчивых σ и c_v . Все вместе служат показателями необходимой длительности ряда наблюдений.

В табл. 6 приведены данные по распределению годовых сумм осадков. При годовых суммах осадков от 1650 до 2250 мм σ варьирует от 220 до 40 мм, а c_v — от 0,13 до 0,20. Средняя по совокупности всего ряда равна 1990 мм, $\sigma = 366$ мм, а $c_v = 0,18$. Параметр по общему ряду, как видно, ближе к характеристике влажных периодов, чем к характеристике сухих. По коэффициентам вариации июльские суммы осадков значительно меньше, чем по месячным суммам. Это обычное явление.

Анализ данных показывает, что для расчета средних величин можно привлекать 20-летние ряды, которые вполне удовлетворительно характеризуют многолетний режим осадков. Для расчета вероятностных данных они недостаточны. По некоторым градациям обеспеченности по ним можно получить недостаточно надежные значения. Так, между суммами осадков соответствующих градаций обеспеченности в интервале 5—20% разности могут достигать —450 мм. Эти разности несколько уменьшаются с увеличением значений обеспеченности, но все же они остаются еще заметно большими. Отсюда следует, что по наблюдениям за 20 лет нельзя получить достаточно надежных данных в вероятностной форме. Для получения надежных вероятностных характеристик необходимо привлекать материалы за более длинные ряды даже при исследовании климатов экваториальной зоны.

По приведенным здесь данным, только 40-летний период наблюдений дает почти такое же распределение годовых сумм осадков по градациям обеспеченности, как и 60-летний. При 40-летних рядах наблюдений нет существенно больших различий между средними влажных и сухих периодов, нет существенных различий в распределении сумм осадков по градациям обеспеченности. При разности около 2000 мм разности между некоторыми суммами одиокой обеспеченности около 80—100 мм мы принимаем за несущественные.

На рис. 1—2 даны кривые хода средних июльских и годовых сумм осадков, вычисленных по скользящим 10, 20, 30 и 40-летним рядам наблюдений на ст. Вальпараисо. Таким же образом построены кривые средних январских, июльских и годовых сумм осадков на ст. Манауса (рис. 3—5). По характеру всех кривых можно заключить, что в выпадении осадков на территории Южной Америки

Таблица 5

Июльские суммы осадков различной обеспеченности. Мангауэ

Характер увлажнения	Сред- няя	Максл- мум	Обеспеченность, %												Мини- мум	σ	с _в
			5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95				
			По 10-летиям														
Влажно	90	269	—	240	159	103	71	53	46	40	34	30	—	30	74	0,82	
	88	269	—	234	154	103	72	53	41	34	31	26	—	25	75	0,85	
	60	182	—	164	109	68	46	37	36	32	28	20	—	17	46	0,77	
	36	66	—	64	58	44	34	28	31	26	22	10	—	1	19	0,53	
	37	69	—	68	64	55	40	30	26	24	20	12	—	1	21	0,56	
По 20-летиям																	
Влажно	70	269	224	160	100	74	54	44	38	36	32	28	21	17	59	0,84	
	71	269	178	127	95	81	61	48	39	34	32	27	20	17	59	0,83	
	60	269	210	110	78	63	52	46	40	32	24	14	6	1	55	0,92	
Около нормы	57	269	184	103	70	56	49	42	35	29	25	18	6	1	54	0,95	

Влажно	71	269	160	114	94	84	64	50	42	36	32	22	18	17	52	0,73
Около нормы	60	269	166	124	83	64	52	43	36	31	26	20	10	1	52	0,86
Сухо	59	269	196	128	81	62	50	42	36	30	28	21	12	1	52	0,89
	58	269	160	114	82	64	50	40	34	30	26	20	12	1	53	0,91

По 40-летиям

Влажно	68	269	170	134	100	78	63	52	44	38	32	24	19	17	48	0,71
Около нормы	60	269	148	108	85	70	56	46	38	33	28	20	8	1	48	0,80
Сухо	59	269	150	110	84	66	53	44	37	32	28	18	8	1	48	0,80
	62	269	154	117	92	74	60	48	40	34	30	20	10	1	48	0,77
По всему ряду	61	269	145	110	84	70	58	49	41	35	29	22	13	1	43	0,70

Годовые суммы осадков различной обеспеченности. Манаус.

Характер увлажнения	Сред- няя	Макси- мум	Обеспеченность, %												Мини- мум	σ	с _в
			5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95				
По 10-летиям																	
Влажно	2253	2673	—	2630	2370	2550	2530	2480	2300	1880	1780	1690	—	1650	390	0,17	
	2254	2673	—	2640	2580	2550	2520	2500	2200	1850	1710	1660	—	1650	398	0,18	
Около нормы	1972	2572	—	2480	2280	2120	2010	1910	1840	1760	1560	1500	—	1418	333	0,18	
Сухо	1627	1982	—	1970	1930	1820	1690	1570	1430	1420	1400	1370	—	1354	233	0,14	
	1653	1982	—	1970	1920	1840	1740	1640	1550	1460	1380	1360	—	1354	223	0,13	
По 20-летиям																	
Влажно	2147	2712	2680	2600	2430	2330	2220	2110	2020	1930	1830	1700	1620	1559	319	0,15	
	2171	2712	2670	2610	2480	2370	2260	2160	2060	1930	1840	1700	1620	1559	323	0,15	
Около нормы	1996	2600	2580	2560	2400	2160	2080	1980	1880	1740	1620	1500	1460	1418	361	0,18	
Сухо	1762	2436	2400	2310	2140	1970	1830	1700	1580	1500	1430	1380	1360	1354	296	0,17	

По 30-летиям

Влажно	2151	2712	2670	2620	2480	2340	2190	2070	1980	1920	1630	1670	1600	1559	331	0,15
	2157	2712	2670	2620	2510	2380	2270	2150	2040	1930	1830	1650	1610	1559	327	0,15
Около нормы	1994	2673	2640	2580	2400	2210	2060	1950	1840	1730	1610	1480	1410	1554	394	0,20
Сухо	1925	2673	2630	2550	2370	2160	1980	1830	1720	1610	1510	1420	1380	1354	404	0,21
	1947	2673	2660	2600	2380	2130	1990	1870	1770	1680	1390	1400	1400	1354	393	0,20

По 40-летиям

Влажно	2094	2712	2700	2610	2440	2070	2150	2030	1940	1860	1770	1870	1570	1418	335	0,16
	2097	2712	2630	2540	2400	2280	2180	2080	2000	1900	1800	1700	1570	1418	335	0,16
Около нормы	1985	2673	2690	2540	2290	2110	1990	1930	1870	1780	1640	1540	1400	1354	363	0,18
Сухо	1957	2673	2630	2560	2410	2250	2100	1930	1830	1670	1560	1450	1390	1354	382	0,20
	1961	2673	2620	2520	2320	2160	2020	1900	1800	1680	1570	1460	1380	1354	380	0,19
По всему ряду	1950	2712	2615	2535	2355	2190	2026	1950	1900	1805	1661	1500	1418	1354	366	0,18

существуют длительные периоды, в течение которых сохраняется то аномально влажный, то аномально сухой режим увлажнения. Именно это и служит одной из причин больших различий между средними значениями, взятыми по разным 10 и 20-летиям. При климатологической обработке данных наблюдений за отдельные годы такие длительные аномальные периоды не могут не сказаться на значениях средних многолетних и вероятностных характеристик. Иллюстрацией, как мы видели, могут служить данные табл. 2—3.

Анализ кривых показывает, что процессы, обуславливающие эти аномальные явления в Вальпараисо и Манаусе, каким-то образом взаимосвязаны. Если в Вальпараисо процессы совершаются все время в направлении уменьшения осадков, то в Манаусе они идут в обратном направлении. Такой вывод можно сделать по кривым средних годовых сумм осадков, вычисленных по 10, 20, 30 и 40-летним данным.

В данной статье эти кривые интересуют нас прежде всего с точки зрения показа длительности аномальных явлений и их влияния на средние значения, полученные по рядам различной длительности. Ясно, что они проявляются не только на нормах, вычисленных по коротким рядам, но и на нормах, вычисленных по длинным рядам.

Анализируя кривые 10-летних июльских и годовых сумм осадков в Вальпараисо и Манаусе, можно видеть, что если некоторые 10-летия в одном пункте приходятся на периоды аномально сухих лет, то в другом пункте — на периоды влажных лет. Так средняя июля за период 1902—1911 гг. в Вальпараисо находится на спаде кривой, но по абсолютному значению эта средняя выше среднего многолетнего значения, вычисленного по наблюдениям за весь период. Средняя июля в Манаусе за это же 10-летие лежит на кривой перед резким подъемом; абсолютное значение этой средней намного ниже нормы.

Такая же картина получается и по кривым 10-летних средних годовых сумм осадков. Средняя за 1902—1911 гг. в Вальпараисо находится на кривой, идущей на спад, а в Манаусе — на кривой, идущей на подъем. В первом случае годовое значение выше нормы, во втором — ниже нормы.

По положению этих средних 10-летних значений на кривых можно заключить, что изменение осадков в полувековом цикле в рассматриваемых районах протекает как бы в противоположных направлениях. Если в Вальпараисо происходит постепенное уменьшение этих средних от одного 10-летия к другому, то в Манаусе в это время наблюдается постепенное увеличение их.

Такая же закономерность прослеживается в ходе средних по другим периодам. Однако из-за большого периода осреднения эти обратные связи получаются менее четкими. Но по кривым 20-летних средних они выступают в явной форме.

Выводы

1. В тропических и экваториальных широтах Южной Америки наблюдаются длительные периоды, в течение которых месячные годовые суммы осадков устойчиво сохраняются то выше нормы, ниже нормы.

2. Продолжительные аномальные сухие и влажные периоды заметно сказываются на средних и вероятностных характеристиках осадков, вычисленных по периодам длительностью менее 20—лет. Для получения более или менее надежных данных, особенно данных различной обеспеченности, необходимо ориентироваться на периоды 30 лет и более.

3. Замечено, что в 10 и 20-летних рядах, характеризующихся усиленным режимом увлажнения, коэффициенты вариации на порядок меньше, чем в соответствующих рядах, характеризующихся обычным режимом.

СОДЕРЖАНИЕ

- И. Д. Копанев. Вероятностная оценка распределения высоты снежного покрова
- И. Д. Копанев. Максимальная высота снежного покрова в районах ЕТС, Западной Сибири и Казахстана
- А. Н. Лебедев, А. С. Егорова, А. Д. Ложкомоева, Т. А. Пусан, А. А. Фан. Исследование опасных и особо опасных полусуточных и суточных сумм осадков
- А. Н. Лебедев, А. Г. Кадырова. О методике обобщения ежедневных наблюдений за температурой воздуха
- А. Г. Кадырова. Продолжительность и интенсивность осадков на территории МНР
- А. Ю. Егорова. Закономерности распределения относительной влажности воздуха в Южной Америке
- И. С. Борушко. Особенности обработки материалов наблюдений по скорости ветра на станциях Южной Америки
- И. С. Борушко. Распределение воздушных течений над Южной Америкой
- А. Г. Кадырова. Вероятность пасмурного состояния неба и осадки над Центральной и Восточной Азией
- В. П. Ходакова. Об изменчивости суммарной солнечной радиации в Южной Америке
- В. П. Ходакова. Об экстремальных значениях температуры воздуха в Индокитае
- А. Н. Лебедев, Е. М. Андреева. Изменение месячных и годовых сумм осадков в Южной Америке в зависимости от длины ряда наблюдений